蘭室秘藏

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

蘭室秘藏

李杲撰

本館叢書集成初編所選
濟生拔萃及古今醫統正
脈全書皆收有此書濟生
僅載醫方盡刪每門通論
故據醫統本排印

蘭室秘藏目錄

卷上

飲食勞倦門
飲食所傷論
勞倦所傷論
調中益氣湯
交泰丸
木香乾薑枳朮丸
和中丸
消積滯集香丸
黃芪當歸湯
益智和中丸
脾胃虛損論
三黃枳朮丸
寬中喜食無厭丸
木香人參生薑枳朮丸
扶脾丸
檳榔丸
黃芪湯
參朮湯
益胃散
巴豆三稜丸

白朮丸
中滿腹脹門
中滿腹脹論
諸腹脹大皆屬於熱論
中滿分消丸
廣茂潰堅湯
破滯氣湯
心腹痞門
消痞丸
黃連消痞丸
蓽蘇丸
胃脘痛門
草豆蔻丸
麻黃豆蔻丸
酒客病論
草豆蔻丸
中滿分消湯
半夏厚朴湯
草豆蔻湯
失哭丸
消痞湯
神聖復氣湯

葛花解醒湯
半夏枳朮丸
除濕益氣丸
升麻黃連丸
瓜蒂散
消渴門
消渴論
和血益氣湯
生津甘露湯
甘草石膏湯
生津甘露飲子
眼耳鼻門
諸脈者皆屬於目論
內障眼論
芎辛湯
枳朮丸
橘皮枳朮丸
除濕散
上二黃丸
當歸潤燥湯
辛潤緩肌湯
甘露膏
碧天丸

廣大重明湯
選奇湯
羌活退臀膏
復明散
吹雲膏
撥雲湯
圓明內障升麻湯
蔓荊子湯
救苦湯
益陰腎氣丸
當歸龍膽湯
瀉陰火丸
溫衛湯
嗜藥麻黃散
加味滋腎丸
百點膏
神効明目湯
明目細辛湯
助陽和血湯
防風飲子
神効黃芪湯
黃芩黃連湯
歸葵湯
熟乾地黃丸
羌活退臀丸
補陽湯
升陽柴胡湯
圓明膏
療本滋腎丸
退臀膏

龍膽飲子
羌活退翳湯
麗澤通氣湯
禦寒湯
柴胡聰耳湯
還睛紫金丹
温肺湯

卷中

頭痛門
頭痛論
清空膏
川芎散
碧雲散
清上瀉火湯
細辛散
養神湯
半夏白朮天麻湯
徹清膏
白芷散
羌活清空膏
補氣湯
羌活湯
安神湯

口齒咽喉門

口齒論
羌活散
麻黃散
治蟲散
蠍梢散
刷牙藥
當歸龍膽散
細辛散
牢牙散
神功丸
神驗法
嘔吐門
丁香茱萸湯
補肝湯
衄血吐血門
草豆蔻散
麝香散
益智木律散
白牙散
獨聖散
牢牙地黃散
立効散
清胃散
桔梗湯又方
白朮湯
吳茱萸丸

麥門冬飲子
麻黃桂枝湯
三黃補血湯
止衄血法
腰痛門
川羌肉桂湯
破血散疼湯
蒼朮湯
緩筋湯
蒼朮復煎散
婦人門
經閉不行有三論
經漏不止有三論
升陽除濕湯
酒煮當歸丸
人參飲子
黃芪芍藥湯
救脈湯
獨活湯
地龍散
麻黃復煎散
拈痛湯
羌活蒼朮湯
涼血地黃湯
固眞丸

烏藥湯
水府丹
黃芪當歸人參湯
柴胡調經湯
升陽舉經湯
半產慎用寒涼之藥論
全生活血湯
調經補眞湯
勝陰丹
柴胡丁香湯
桂附湯
黃芪白朮湯
增味四物湯
溫衝補血湯
四聖散
助陽湯
丁香膠艾湯
當歸芍藥湯
益胃升陽湯
當歸附子湯
坐藥龍鹽膏
迴陽丹
延胡苦練湯
人參補氣湯
白朮茯苓湯
補經固眞湯
立効散
溫經除濕湯

補氣升陽和中湯
卷下
大便結燥門
大便結燥論
通幽湯
潤腸丸
升陽湯
潤腸湯
小便淋閉門
小便淋閉論
通關丸
導氣除燥湯
痔漏門
痔漏論
秦艽白朮丸
麻黃桂枝升麻湯
潤燥湯
麻黃白朮湯
活血潤燥丸
清肺飲子
腎疸湯
秦艽蒼朮湯

七聖丸
秦艽羌活湯
紅花桃仁湯
陰痿陰汗門
陰痿陰汗及臊臭論
龍膽瀉肝湯
固眞湯
椒粉散
温腎湯
瀉痢門
訶子皮散
升陽去熱和血湯
芍藥糞皮丸
槐花散
黄芪補胃湯
秦艽防風湯
當歸郁李仁湯
秦艽當歸湯
清震湯
清寃湯
補肝湯
延胡丁香丸
升麻補胃湯
益智和中湯
和中益胃湯
茯苓湯
升陽除濕湯

人參益胃湯
瘡瘍門
散腫潰堅湯
連翹散堅湯
救苦化堅湯
黍粘子湯
消腫湯
升麻托裏湯
柴胡通經湯
保生救苦散
聖愈湯
黃芪肉桂柴胡酒煎湯
雜病門
安神丸
補氣湯
升麻補胃湯
升陽調經湯
龍泉散
柴胡連翹湯
淨液湯
內托羌活湯
內托黃芪湯
白芷升麻湯
一上散
獨聖散
硃砂安神丸
當歸補血湯

柴胡升麻湯
小黃丸
補益腎肝丸
麻黃茱萸湯
除濕補氣湯
升陽湯
自汗門
自汗論
調衛湯
當歸六黃湯
活血通經湯
人參益氣湯
補中湯
上清湯
正氣湯
火鬱湯
黃芩利膈丸
太陽經嚏藥
黃芪湯
參歸湯
清燥湯
紅豆散
瀉榮湯
導氣湯
麻黃蒼朮湯
朮桂湯
趁痛丸

退熱湯
天麻黃芪湯
白朮除濕湯
瀉血湯
瑩肌如玉散
小兒門
治驚論
黃芪湯
升陽益血湯
補陽湯
塌氣退黃湯
消痞丸
斑疹論
消毒救苦散
黍粘子湯
解表升麻湯
健步丸
加味四君子湯
洗面藥
面油摩風膏
益黃散
厚腸丸
大蕉黃湯
中滿分消丸
桔梗湯
麻黃柴胡升麻湯

蘭室秘藏卷上

東垣老人李杲撰

飲食勞倦門

飲食所傷論

陰陽應象論云。水穀之寒熱。感則害人六府。痺論云。陰氣者。靜則神藏。躁則消亡。飲食自倍。腸胃乃傷。此乃混言之也。分之爲二。飲也。食也。飲者。水也。無形之氣也。因而大飲則氣逆形寒。飲冷則傷肺。病則爲喘咳。爲腫滿。爲水瀉。輕則當發汗利小便。使上下分消其濕。解醒湯。五苓散。生薑半夏枳實白朮之類是也。如重而畜積爲滿者。芫花大戟甘遂牽牛之屬利下之。此其治也。食者。物也。有形之血也。如生氣通天論云。因而飽食。筋脈橫解。腸澼爲痔。又云。食傷太陰厥陰。寸口大於人迎兩倍三倍者。或嘔吐。或痞滿。或下痢腸澼。當分寒熱輕重而治之。輕則內消。重則除下。如傷寒物者。半夏神麴乾薑三稜廣朮巴豆之類主之。如傷熱物者。枳實白朮青皮陳皮麥蘗黃連大黃之類主之。亦有宜吐者。陰陽應象論云。在上者因而越之。瓜蒂散之屬主之。然而不可過劑。過劑則反傷腸胃。蓋先因飲食自傷。又加之以藥。過故腸胃復傷。而氣不能化。食愈難消矣。漸至羸困。故五常政大論云。大毒治病。十去其六。小毒治病。十去其七。凡毒治病。不可過之。此聖人之深戒也。

勞倦所傷論

調經篇云。陰虛生內熱。岐伯曰。有所勞倦。形氣衰少。穀氣不盛。上焦不行。下脘不通。而胃氣熱。熱氣薰胸中。故內熱。舉痛論云。勞則氣耗。勞則喘且汗出。內外皆越。故氣耗矣。夫喜怒不節。起居不時。有所勞傷。皆損其氣。氣衰則火旺。火旺則乘其脾土。脾主四肢。故困熱無氣以動。懶於語言。動作喘乏。表熱自汗。心煩不安。當病之時。宜安心靜坐以養其氣。以甘寒瀉其熱火。以酸味收其散氣。以甘溫補其中氣。經言勞者溫之。損者溫之者是也。金匱要略云。平人脈大爲勞。脈極虛亦爲勞矣。夫勞之爲病。其脈浮大。手足煩熱。春夏劇。秋冬差。（脈大者。熱邪也。極實者。氣損也。春夏劇者。時助邪也。秋冬差者。時勝邪也。）以黃芪建中湯治之。此亦溫之之意也。夫上古聖人飲食有節。起居有常。不妄作勞。形與神俱。百歲乃去。此謂治未病也。今時之人。去聖人久遠。則不然。飲食失節。起居失宜。妄作勞役。形氣俱傷。故病而後藥之。是治其已病也。推其百病之源。皆因飲食勞倦而胃氣元氣散解。不能滋榮百脈。灌溉臟腑。衛護周身之所致也。故蒼天之氣。貴清靜。陽氣惡煩勞。噫。飲食喜怒之間。寒暑起居之際。可不愼歟。

調中益氣湯

治因飢飽勞役。損傷脾胃。元氣不足。其脈弦洪緩而沉。按之中之下得時一澀。其證四肢滿悶。肢節疼痛。難以屈伸。身體沉重。煩心不安。忽肥忽瘦。四肢懶倦。口失滋味。腹難舒伸。大小便清利而數。或上飲下便。或大便澀滯。或夏月餐泄。米穀不化。或便後見血。或便見白膿。胸滿短氣。咽膈不通。痰唾稠粘。口

中沃沫。食入反出。耳鳴耳聾。目中流火。視物昏花。努肉紅絲。熱壅頭目。不得安臥。不思飲食。並皆治之。

橘皮（如腹中氣不轉運。加木香一分。如無此證不加。）　黃蘗（酒洗。已上各貳分。）

升麻（此一味爲上氣不足。胃氣與脾氣下流。乃補上氣。健陰引陽。）　柴胡（已上各叁分。）

人參（有嗽者去。）　炙甘草

蒼朮（已上各伍分。）　黃芪（壹錢）

如是顯熱躁。是下元陰火蒸蒸然發也。加生地黃（貳分。）黃蘗（叁分。）

如大便虛坐不得。或大便了而不了。腹中常常逼迫。皆是血虛血澀。加當歸身（叁分。）無此證則去之。

如身體沉重。雖小便數多。亦加茯苓（貳分。）黃蘗（叁分。）澤瀉（伍分。）蒼朮（壹錢。）時暫從權而去濕也。不可常用。

兼足太陰已病。其脈亦絡於心中。故顯濕熱相合。而生煩亂。

如胃氣不和。加湯洗半夏（伍分。）生薑（叁片。）有嗽者加生薑生地黃（貳分。）以製半夏之毒。

如痰厥頭痛。非半夏不能除。此足太陰脾邪所作也。如兼躁熱。加黃蘗生地黃（各貳分。）

如無已上證。只服前藥。

右件劑如麻豆大。都作一服。水二大盞。煎去柤。稍熱食。遠服之。寧心絕慮。靜坐少語。藥必爲効耳。

如夏月須加白芍藥叁分。

如春月腹中痛尤宜加。

如惡熱而渴。或腹痛者。更加芍藥伍分。生黃芩貳分。

如惡寒腹痛。加中桂叁分。去黃芩。謂之桂枝芍藥湯。亦於前藥中加之。

如冬月腹痛。不可用芍藥。蓋大寒之藥也。只加乾薑貳分。或加半夏伍分。柒以生薑少許製之。

如秋冬之月。胃脈四道爲衝脈所逆。脇下少陽脈二道而反上行。名曰厥逆。其證氣上衝咽。不得息。而喘息有音。不得臥。加吳茱萸伍分至壹錢。湯洗去苦。觀厥氣多少而用之。亦於前藥中作一服服之。

如夏月有此證。爲大熱也。此病隨四時爲寒熱溫涼也。宜以

黃連酒洗。　黃蘗酒浸。　知母酒浸。已上各等分。

右爲細末。熟湯爲丸。如梧桐子大。每服一百丸。或二百丸。白湯送下。空心服。仍多飲熱湯。服畢少時。便以美食壓之。使不令胃中停留。直至下元。以瀉衝脈之邪也。大抵治飲食勞倦所得之病。乃虛勞七損證也。常宜以甘溫平之。甘多辛少。是其治也。

寬中喜食無厭丸一名寬中進食丸。

資形氣喜飲食

木香伍分　青皮
乾生薑已上各壹錢　炙甘草壹錢伍分　人參
澤瀉　檳榔　白茯苓
白朮已上各貳錢　縮砂仁　橘皮
枳實肆錢　草豆蔻仁伍錢　豬苓已上各貳錢伍分
半夏柒錢　大麥蘗麵壹兩炒　神麴伍錢伍分炒

右爲細末湯浸餘餅爲丸如梧桐子大每服三五十丸米湯下食遠

交泰丸

升陽氣瀉陰火調榮氣進飲食助精神寬腹脇除怠惰嗜臥四肢沉困不收

乾薑炮製叁分　巴豆霜伍分　人參去芦
肉桂去皮已上各壹錢　柴胡去苗　小椒炒去汗子并閉目
白朮已上各壹錢伍分　厚朴去皮炒叁錢秋冬加柒錢　白茯苓
苦練酒煮　縮砂仁已上各叁錢　知母肆錢一半酒炒一半酒洗春夏用秋冬去
川烏炮製去皮臍肆錢伍分　吳茱萸湯洗柒次伍錢　皂角水洗煨去皮弦

紫菀去苗已上各陸錢　黃連去鬚染錢秋冬減壹錢伍分

右除巴豆霜別研外同爲極細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服十丸溫水送下食遠虛實加減

木香人參生薑枳朮丸

開胃進飲食

乾生薑貳錢伍分　木香叁錢　枳實壹兩炒　人參叁錢伍分　白朮壹兩伍錢

陳皮肆錢

右爲細末荷葉裹燒飯爲丸如梧桐子大每服三五十丸溫水下食前

木香乾薑枳朮丸

破除寒滯氣消寒飲食

木香叁錢　乾薑伍錢炮　枳實壹兩炒　白朮壹兩伍錢

右爲細末荷葉裹燒飯爲丸如梧桐子大每服三五十丸溫水送下食前

扶脾丸

治脾胃虛寒腹中痛溏瀉無度飲食不化

乾生薑　肉桂已上各伍分　乾薑

霍香　紅豆已上各壹錢。白朮

茯苓　橘皮　半夏

訶子皮　炙甘草　烏梅肉已上各貳錢。

大麥蘗炒　神麴炒已上各肆錢。

右爲細末。荷葉燒飯爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。白湯送下。食前。

和中丸

補胃進食。

人參　乾生薑　陳皮已上各壹錢。

乾木瓜貳錢。　炙甘草叁錢。

右爲細末。湯浸餘餅爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。白湯送下。食前。

檳榔丸

破滯氣。消飲食。

炙甘草壹錢。　木香　人參

檳榔已上各貳錢。　陳皮伍錢。

右爲細末。湯浸餘餅爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。白湯下。食前。

消積滯集香丸

治傷生冷硬物不消。

京三稜　廣茂　青皮

陳皮　丁香皮　益智

川練子　茴香已上各壹兩。　巴豆和皮米炒焦伍錢。

右爲細末。醋糊爲丸。如棗豆大。每服五七丸。温水生薑湯任下。食前服。

黃芪湯

補胃除濕。和血益血。滋養元氣。

木香氣通去之。　霍香葉已上各壹錢。　當歸酒洗。

陳皮已上各貳錢。　人參　澤瀉已上各伍錢。

黃芪壹兩。

右咬咀。每服五錢。水二大盞。煎至一盞。如欲汗加生薑煎。食遠熱服之。

黃芪當歸湯

治熱上攻頭目。沿身胸背發熱。

當歸身壹錢。酒洗。　黃芪伍錢。

右㕮咀。作一服。水二大盞。煎至一盞。食前熱服。

參朮湯

治脾胃虛弱。元氣不足。四肢沉重。食後昏悶。

黃蘗酒浸。當歸已上貳分。各
升麻已上叁分。人參
青皮已上伍分。神麴末柒分。各
蒼朮已上壹錢。黃芪貳錢。各

右㕮咀。都作一服。水二大盞。煎至一盞。食遠服。

益智和中丸李秋谷。

木香　黃連
黃芪　人參
神麴末　當歸身
陳皮　姜黃已上伍分。各
桂花壹錢。桂枝壹錢伍分。
炙甘草貳錢伍分。　麥蘗麵叁錢。

柴胡
陳皮
炙甘草

生地黃已上貳分。各
麥門冬
乾生薑
縮砂仁柒分。
益智仁貳錢貳分。
草豆蔻仁肆錢。

右爲細末。湯浸餘餅爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。白湯下。細嚼亦當。

益胃散

治因服寒藥過多。以致脾胃虛損。胃脘疼痛。

人參　甘草　縮砂仁
厚朴（已上各貳錢）　白豆蔻　姜黃
乾生薑　澤瀉（已上各參錢）　益智仁（陸錢）
黃芪　陳皮（已上各柒錢）

右爲麤末。每服三錢。水二盞。生薑五片。煎至一盞。去柤。食前溫服。

脾胃虛損論

易水張先生。常戒不可峻利。食藥下咽。未至藥丸施化。其標皮之力始開。便言快也。所傷之物已去。若更待一兩時辰許。藥盡化開。其藥峻利。必有情性。病去之後。脾胃既損。是眞氣元氣敗壞。促人之壽。當時設下一藥。枳實一兩。麩炒黃色爲度。白朮二兩。只此二味。荷葉裹燒飯爲丸。以白朮甘溫。甘溫補脾胃之元氣。其苦味除胃中之濕熱。利腰臍間血。故先補脾胃之弱。過於枳實剋化之藥一倍。枳實味苦寒。泄心下之痞悶。消化胃中所傷。此一藥下胃。其所傷不能卽去。須待一兩時辰許。食則消化。是先補其虛而後化其所傷。則不峻利矣。當是之時。未悟用荷葉燒飯爲丸之理。老年味之始得。可謂奇矣。荷葉之物。中央空。

象震卦之體震者動也人感之生足少陽甲膽者風也生化萬物之根蔕也內經云厥端於始序則不愆人之飲食入胃營氣上行卽少陽甲膽之氣也其手少陽三焦經人之元氣也手足經同法便是少陽元氣生發也胃氣穀氣元氣甲膽上升之氣一也異名雖多止是胃氣上升者也荷葉之體生於水土之下出於汚濊之中非汚所染挺然獨立其色青形乃空青而象風木者也食藥感此氣之化胃氣何由不上升乎其主意用此一味爲引用可謂遠識深慮合於道者也更以燒飯和藥與白朮協力滋養穀而補令胃厚再不至內傷其利廣矣大矣若內傷脾胃辛熱之物酒肉之類自覺不快覓藥於醫醫者亦不問所傷付之集香丸小丁香丸巴豆大熱藥之類下之大便下則物去遺留食之熱性藥之熱性重傷元氣則七神不熾經云熱傷氣正謂此也其人必無氣以動而熱困四肢不舉傳變諸疾不可勝數使人眞氣自此衰矣若傷生冷硬物世醫或用大黃牽牛二味大寒藥投之隨藥下所傷去矣遺留食之寒性藥之寒性重瀉其陽陽去則皮膚筋肉血脈無所依倚便爲虛損之證論言及此令人寒心夫辛辣薄味之藥無故不可亂服非止牽牛而已至眞要大論云五味入口各先逐其所喜攻攻者尅伐瀉也辛味下咽先攻瀉肺之五氣氣者眞氣元氣也其牽牛之辛辣猛烈傷人尤甚飲食所傷腸胃□當以苦泄其腸胃可也肺與元氣何罪之有用牽牛大罪有五此其一也況胃主血所生病爲所傷物者有形之物也皆是血病瀉其氣其罪二也且飲食傷之於中焦止合尅化消導其食重瀉上焦肺中已虛之氣其罪三也食傷腸胃當塞因塞用又曰寒因寒用枳實大黃苦寒之物以泄有形是也反以辛辣牽牛散瀉眞氣大禁四也

殊不知鍼經有云外來客邪風寒傷人五臟若誤瀉胃氣必死誤補亦死其死也無氣以動故靜若內傷腸胃而反瀉五臟必死誤補亦死其死也陰氣有餘故躁今內傷腸胃是謂六腑不足之病反瀉上焦虛無肺氣肺者五臟之一數也雖不卽死若更旬日之間必暗損人壽數謂如人壽應百歲爲牽牛之類朝損暮損其元氣消耗不得終其天年但人不覺耳將爲天年已盡此乃暗裏折人壽數故特著此論幷方庶令四海聞而行之不至夭橫耳此老夫之用心也胃氣不可不養復明養胃之理內經云安穀者昌絕穀者亡水去則榮散穀消則衞亡榮散衞亡神無所依仲景云水入於經其血乃成穀入於胃脈道乃行故血不可不養胃不可不溫血養胃溫榮衞將行常有天命穀者身之大柄也書與周禮皆云金木水火土穀惟脩以奉養五臟者也內傷飮食固非細事苟妄服食藥而輕生殞命其可乎哉黃帝鍼經有說胃惡熱而喜淸冷大腸惡淸冷而喜熱兩者不和何以調之岐伯曰調此者食飮衣服亦欲適寒溫寒無淒泄暑無汗飮食者熱無灼灼寒無淒淒寒溫中適故氣將持乃不致邪僻也是必有因用豈可用俱寒俱熱之藥倉卒致損與以刃殺人者何異內經說內傷者其氣口脈反大於人迎一倍二倍三倍分經用藥又曰上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死如但食不納惡心欲吐者不問一倍二倍不當正與瓜蒂散吐之但以指或以物探去之若所傷之物去不盡者更診其脈問其所傷以食藥去之以應塞因塞用又謂之寒因寒用泄而下降乃應太陰之用其中更加升發之藥令其元氣上升塞因通用因曲而爲直何爲曲內傷胃氣是也何爲直因而升發胃氣是也因其飮食之內傷而使生氣增益胃氣完復此乃因

曲而爲之直也。若分經用藥。其所傷之物。寒熱温涼。生硬柔輭。所傷不一。難立定一法。只隨所傷之物不同。各立治法。臨時加減用之。其用藥又當問病人從來稟氣盛衰。所傷寒物熱物是喜食之耶。不可服破氣藥。若乘飢困而傷之耶。當益胃氣。或爲人所勉勸強食之。宜損血而益氣也。診其脈候。傷在何臟。可與對病之藥。豈可妄瀉天眞元氣。以輕喪身寶乎。且如先食熱物而不傷。繼之以寒物。因後食致前食亦不消化而傷者。當問熱食寒食孰多孰少。斟酌與藥。無不當矣。喻如傷熱物二分。寒物一分。則當用寒藥二分。熱藥一分。相合而與之。則榮衛之氣必得周流。更有或先飲酒而後傷寒冷之食。及傷熱食冷水與冰。如此不等。皆當驗其節次所傷之物。酌量寒熱之劑分數。各各對證與之。無不取効。自忖所定藥方。未敢便謂能盡性藥之理。姑用指迷辯惑耳。

三黃枳朮丸

治傷肉濕麵辛辣味厚之物。塡塞悶亂不快。

枳實（麩炒。伍錢。）　黃連（去鬚。酒洗。）　大黃（濕紙裹煨。）　白朮（已上各壹兩。）

神麯炒。

黃芩貳兩。

右爲極細末。湯浸餬餅爲丸。如菉豆一倍大。每服五十丸。白湯下。臨時量所傷多少加減服之。

巴豆三稜丸一名木香見現丸。

治傷生冷硬物心腹滿悶疼痛。

巴豆霜伍分。　木香貳錢。
柴胡已上各叁錢。　草豆蔻麵裹煨熟用仁。
神麴炒黃色。　石三稜去皮煨。

右爲細末。湯浸餬餅爲丸。如菉豆一倍大。每服一二十丸。温白湯下。量所傷多少加減服之。

白朮丸

治傷豆粉濕麵油膩之物。

白礬枯叁錢。　升麻
神麴炒黃色。　香附子炒已上各伍錢。
枳實麩炒黃色。壹兩。　京三稜煨已上各壹兩。

黃芩伍錢。　橘皮柒錢。
半夏湯洗七次。　白朮已上各壹兩。

右爲極細末。湯浸餬餅爲丸。如菉豆大。每服三五十丸。白湯下。素食多用乾薑。故加黃芩以瀉之。

草豆蔻丸

治秋冬傷寒冷物。胃脘當心而痛。上支兩脇。咽膈不通。

炒鹽伍分。　乾生薑　青皮
橘皮已上各貳錢。　麥蘗麵炒黃色。　生黃芩冬月不用。

半夏湯洗七次。　神麯炒。已上各伍錢。　草豆蔻麵裹煨。去皮取仁。
白朮已上各壹兩。　枳實麩炒。貳兩。

右爲極細末。湯浸餘餅爲丸。如梧豆大。每服五十丸。白湯下。

中滿腹脹門

中滿腹脹論

六元政紀論云。太陰所至爲中滿。太陰所至爲畜滿。諸濕腫滿。皆屬脾土。論云。脾乃陰中之太陰。同濕土之化。脾濕有餘。腹滿食不化。天爲陽爲熱。主運化也。地爲陰爲濕。主長養也。無陽則陰不能生化。故云藏寒生滿病。調經篇云。因飲食勞倦。損傷脾胃。始受熱中。末傳寒中。皆由脾胃之氣虛弱。不能運化精微而制水穀。聚而不散。而成脹滿。經云。腹滿膨脹。支膈胠脇下厥上胃。過在太陰陽明。乃寒濕鬱遏也。脈經所謂胃中寒則脹滿者。是也。（鍼經三卷雜病第八）腹滿大便不利。上走胸嗌。喘息喝喝然。取足少陰。又云。脹取三陽。三陽者。足太陽寒水爲脹。與通評虛實論說腹暴滿按之不下。取太陽經絡。胃之募也。正同。取者瀉也。經云。中滿者瀉之於內者是也。宜以辛熱散之。以苦瀉之。淡滲利之。使上下分消其濕。正如開鬼門。潔淨府。溫衣繆刺其處。是先瀉其血絡。後調其眞經。氣血平。陽布神清。此治之正也。或曰。諸脹腹大。皆屬於熱者何也。此乃病機總辭。假令外傷風寒有餘之邪。自表傳裏。寒變爲熱。而作胃實腹滿。仲景以大承氣湯治之。亦有膏粱之人。濕熱鬱於內而成脹滿者。此熱脹之謂也。大抵寒脹多而熱脹少。治之者宜詳辨之。

諸腹脹大皆屬於熱論

諸腹脹大皆屬於熱。此乃八益之邪有餘之證。自天外而入。是感風寒之邪傳裏。寒變爲熱。作胃實。日晡潮熱。大渴引飲。譫語。是太陽陽明幷大實大滿者。大承氣下之。少陽陽明微滿實者。小承氣下之。泄之則脹已。此之謂也。假令痎瘧爲脹滿。亦有寒脹熱脹。是天之邪氣傷暑而得之。不卽時發。至秋暑氣衰絕而瘧病作矣。知其寒也。局方用交解飲子者是也。內虛不足。寒濕令人中滿。及五臟六腑俱有脹滿。更以脈家寒熱多少較之。胃中寒則脹滿。濁氣在上。則生膶脹。取三陽。三陽者。足太陽膀胱寒水爲脹。腹暴滿。按之不下。取太陽經絡者。胃之募也。正同腹滿膶脹。肢膈肤脇下厥上冒。過在太陰陽明。胃中寒濕鬱遏也。太陰膶脹。復不利。不欲食。食則嘔。不得臥。按所說寒脹之多如此。中滿治法。當開鬼門。潔淨府。開鬼門者。謂發汗也。潔淨府者。利小便也。中滿者。瀉之於內。謂脾胃有病。當令上下分消其濕。下焦如瀆。氣血自然分化。不待泄滓穢。如或大實大滿。大小便不利。從權以寒熱藥下之。或傷酒濕麵及味厚之物。膏粱之人。或食已便臥。使濕熱之氣不得施化。致令腹脹滿。此脹亦是熱脹。治熱脹分消丸主之。如或多食寒涼。及脾胃久虛之人。胃中寒則脹滿。或藏寒生滿病。以治寒脹中滿分消湯主之。

中滿分消丸

治中滿熱脹。鼓脹。氣脹。水脹。此非寒脹類

白朮　人參　炙甘草

豬苓去黑皮。　姜黃已上各壹錢。　白茯苓去皮。
乾生薑　砂仁已上各貳錢。　澤瀉
橘皮已上各叁錢。　知母炒貳錢。　黃芩去腐炒。夏用壹兩貳錢。
黃連淨炒。　半夏湯洗七次。　枳實炒。已上各伍錢。
厚朴薑製。壹兩。

右除茯苓澤瀉生薑外。共爲極細末。入上三味和勻。湯浸餛餅爲丸。如梧桐子大。每服一百丸。焙熱白湯下。食遠服。童病人大小加減。

中滿分消湯

治中滿。寒脹。寒疝。大小便不通。陰躁。足不收。四肢厥逆。食入反出。下虛中滿。腹中寒。心下痞。下焦躁寒。沉厥。奔豚不收。

川烏　澤瀉　黃連
人參　青皮　當歸
生薑　麻黃　柴胡
乾薑　葶藶炒。已上各貳分。　益智仁
半夏　茯苓　木香

升麻已上各叁分　黃芪　吳茱萸

厚朴　草豆蔻仁　黃檗已上各伍分

右剉如麻豆大。都作一服。水二大盞。煎至一盞。食前熱服。忌房室酒濕麵生冷及油膩等物。

廣茂潰堅湯

治中滿腹脹。內有積聚。堅硬如石。其形如盤。令人不能坐臥。大小便澀滯。上喘氣促。面色痿黃。通身虛腫。

廣茂　紅花　升麻

吳茱萸已上各貳分　生甘草　柴胡

澤瀉　神麴　青皮

陳皮已上叁分各　厚朴生用　黃芩

黃連　益智仁　草豆蔻仁

當歸梢已上各伍分　半夏柒分

如渴加葛根肆分。

右剉如麻豆大。水二大盞。煎至一盞。稍熱服。食遠。忌酒醋濕麵。服二服之後。中滿減半止。有積不消。再

服後藥。

半夏厚朴湯

紅花　蘇木已上各半分。　吳茱萸

乾生薑　黃連已上各壹分。　木香

青皮已上各貳分。　肉桂　蒼朮

白伏苓　澤瀉　柴胡

陳皮　生黃芩　草豆蔻仁

生甘草已上各叁分。　京三稜　當歸酒洗

豬苓　升麻已上各肆分。　神麯一分。

厚朴捌分。　半夏壹錢。　桃仁柒箇。

昆布少許。

如渴加

葛根叁分。

右咬咀。作一服。水三盞。煎至一盞。去粗稍熱服。此藥二服之後。前證又減一半。却於前藥中加減服之。

破滯氣湯一名木香化滯散。

破滯氣治心腹滿悶
炙甘草肆分　白檀　霍香
陳皮　大腹子　白豆蔻仁
白茯苓　桔梗已上各伍分　砂仁
人參　青皮　檳榔
木香　姜黃　白朮已上各貳錢

右咬咀每服三錢水二盞煎至一盞去柤温服不拘時

草豆蔻湯
治腹中虛脹

澤瀉壹分　木香叁分　神麴肆分
半夏製　枳實　草豆蔻仁
黃芪春夏去之　益智　甘草已上各伍分
青皮　陳皮已上各陸分
當歸已上各染分

右爲麤末都作一服水二大盞生薑三片煎至一盞去柤温服冬月加黃芪五七分春夏止服正藥食

遠

心腹痞悶

消痞悶

治心下痞悶。一切所傷。及積年不愈者。

乾生薑　神麴炒。　炙甘草已上各貳分。

豬苓貳錢伍分。　澤瀉　厚朴

砂仁已上各叁錢。　半夏湯洗七次。　陳皮

人參已上各肆錢。　枳實伍錢炒。　黃連淨炒。

黃芩已上各陸錢。　姜黃　白朮已上各壹兩。

右爲細末。湯浸飜餅爲丸。如梧桐子大。每服五七十丸至百丸。白湯送下。食遠服。

失咲丸一名枳實消痞丸。

治右關脈弦。心下虛痞。惡食懶倦。開胃進飲食。

乾生薑壹錢。　炙甘草　麥蘗麵

白茯苓　白朮已上各貳錢。　半夏麴

人參已上各叁錢。　厚朴肆錢炙。　枳實

黃連伍錢已上各

右爲細末湯浸餘餅爲丸梧桐子大每服五七十丸白湯下食遠服

黃連消痞丸

治心下痞滿壅滯不散煩熱喘促不安

澤瀉　姜黃壹錢已上各
炙甘草　茯苓
陳皮伍錢　豬苓伍錢已上各
半夏玖錢　黃連壹兩

右爲細末湯浸餘餅爲丸如梧桐子大每服五十丸溫湯下食遠

消痞湯一名木香化滯湯

治因憂氣鬱結中脘腹皮裏微痛心下痞滿不思飲食

枳實炒　當歸梢貳分已上各
生薑　木香叁分已上各
草豆蔻　炙甘草伍分已上各
紅花少許

乾生薑貳錢
白朮叁錢已上各
枳實炒染錢
黃芩炒貳兩

陳皮
柴胡肆分
半夏壹錢

右爲麤末作一服水二盞生薑三片煎至一盞食遠服忌酒濕麵

葶藶丸一名人參順氣飲子

治心下痞胸中不利

半夏洗　厚朴炙　石膏

青皮已上各伍分　當歸身柒分　白豆蔻仁

縮砂　茵蔯酒製　乾葛已上各壹錢　黃芩一半酒洗一半炒

炙甘草　羌活　柴胡

苦葶藶酒炒洗　人參

獨活已上各叁錢

右爲細末湯浸餻餅和勻篩子內擦如米大每服二錢臨臥用一口湯下

胃脘痛門

草豆蔻丸

治脾胃虛弱而心火乘之不能滋榮上焦元氣遇冬腎與膀胱寒水旺時子能令母實以致肺金大腸相輔而來剋心乘脾胃此大復讎也經云大勝必大復理之常也故皮毛血脈分肉之間元氣已絕於外又大寒大燥二氣併乘之則苦惡風寒耳鳴及腰背相引而痛鼻息不通不聞香臭額寒腦痛大惡

風寒。目時眩不欲開。腹中爲寒水反乘。痰唾沃沫。食則反出。腹中常痛。心胃作痛。脇下縮急。有時而痛。腹不能努。大便多瀉而少祕。下氣不絕。或腹中鳴。此脾胃虛之至極也。胸中氣亂。心煩不安。而爲霍亂之漸。咽膈不通。極則噎塞。有聲喘喝。閉塞。或於日陽處。或於暖室中。少緩口吸風寒之氣。則復作四肢厥逆。身體沉重。不能轉側。頭不可以回顧。小便溲而時躁。此藥主之。秋冬寒涼大復氣之藥也。

神麯末　柴胡詳脇下痛多少用之。　姜黃已上各肆分。
當歸身　青皮已上各陸分。　黃芪
人參　益智仁　吳茱萸湯洗焙乾。
陳皮　白僵蠶已上各捌分。　澤瀉小便數減半。
半夏已上各壹錢洗。裹燒熱爲末。　甘草生陸分。熟陸分。　麥蘗麵壹錢伍分炒。
草豆蔻仁麵裹煨壹錢肆分。　桃仁柒箇湯浸去皮尖。

右除桃仁別研如泥。餘爲細末同研勻。湯浸餙餅爲丸。如梧桐子大。每服五七十丸。白湯下。食遠服。

神聖復氣湯

治復氣乘冬。足太陽寒水足少陰腎水之旺。子能令母實。手太陰肺實反來剋土。火木受邪。腰背胸膈閉塞疼痛。善噦。口中涎。目中泣。鼻中流濁涕不止。或如息肉不聞香臭。欬嗽痰沫。上熱如火。下寒如冰。頭作陣痛。目中溜火。視物眩眩。耳聾耳鳴。頭幷口鼻大惡風寒。喜日晴暖。夜臥不安。常覺痰塞。咽膈不

通口不知味。兩脇縮急而痛。牙齒動搖。不能嚼物。臍腹之間及尻臀足膝。不時寒冷。前陰冷而多汗。行步欹側。起居艱難。麻木風痺。小便數。氣短喘喝。少氣不足以息。遺失無度。及婦人白帶。陰戶中大痛牽心。面色黧黑。男子控睾痛牽心腹。或面色如赭。食少。大小便不調。煩心霍亂。逆氣裏急。腹不能努。或腸鳴。膝下筋急。肩脾大痛。此皆寒水來復火土之讎也。

乾薑炮。　黑附子炮。已上各叁分。　防風

人參　郁李仁另研。已上各伍分。　當歸身陰分。酒洗。

半夏湯洗。　升麻已上各柒分。　藁本

甘草已上各捌分。　柴胡　羌活已上各壹錢。

白葵花伍朵。去心剪碎。

右件都作一服。水五大盞。煎至二盞。入黃芪一錢。橘紅五分。草豆蔻仁一錢。麵裹煨熟去皮一錢。同煎至一盞。再入下項藥。黃檗三分。酒浸黃連三分。酒浸枳殼三分。生地黃三分。酒洗。此四味預一日另用新水浸。又以華細辛二分。川芎細末三分。蔓荊子三分。作一處浸。此三味幷黃檗等煎正藥作一大盞。不去粗。入此所浸之藥。再上火同煎至一大盞。去粗熱服。空心。又能治嚼頰。嚼唇舌。舌根強硬等證。如神忌肉湯。宜食肉。不助經絡中火邪也。大抵腎元與膀胱經中有寒氣不足者。幷宜服之。於月生月滿時食。隔三五日一服。如病急。不拘時候。

麻黃豆蔻丸

治客寒犯胃。心胃大痛不可忍。

木香　青皮　紅花

厚朴已上各貳分。　蘇木叁分。　華澄茄肆分。

升麻　半夏湯洗。　麥蘗麵

縮砂仁　黃芪　白朮

陳皮去白。　柴胡　炙甘草

吳茱萸　當歸身伍分。已上各　益智仁捌分。

神麯末貳錢。炒。　麻黃叁錢。下去節　草豆蔻仁伍錢。

右爲細末。湯浸餌爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。白湯下。或細嚼湯下亦可。

酒傷病論

論酒大熱有毒。氣味俱陽。乃無形之物也。若傷之。則止當發散。汗出則愈矣。此最妙法也。其次莫如利小便。二者乃上下分消其濕。何酒病之有。今之酒病者。往往服酒癥丸大熱之藥下之。又有牽牛大黃下之。是無形元氣受病。反下有形陰血。乖慢甚矣。酒性大熱。已傷元氣。而復重瀉之。況亦損腎水眞陰及有形陰血。俱爲不足。如此則陰血愈虛。眞水愈弱。陽毒之熱大旺。反增其陰火。是謂元氣消亡。七神何依。折人

長命雖不卽死而虛損之病成矣金匱要略云酒疸下之久久爲黑疸愼不可犯此戒不若令上下分消其濕當以葛花解醒湯主之

葛花解醒湯

木香伍分　人參去蘆　猪苓去黑皮　白茯苓　橘皮已上各壹錢伍分　白朮　乾生薑　神麯炒　澤瀉已上各貳錢　蓮花青皮叁錢　縮砂仁　白豆蔻仁　葛花已上各伍錢

右爲極細末和勻每服三錢匕白湯調下但得微汗酒病去矣此蓋不得已而用豈可恃賴日日飲酒此藥氣味辛辣偶因酒病服之則不損元氣何者敵酒病故也若頻服之損人天命

枳朮丸

治痞消食強胃

枳實麩炒黃色壹兩　白朮貳兩

右爲極細末荷葉裹燒飯爲丸如菉豆一倍大每服五十丸白湯下不拘時候量所傷多少加減服之

半夏枳朮丸

治因冷物內傷。

半夏湯洗七次壹兩。　枳實麩炒黃色。　白朮貳兩已上各

右三味爲極細末荷葉裹燒炊飯爲丸如梧桐子大一倍大每服五十丸白湯下量所傷加減服之。

橘皮枳朮丸

治元氣虛弱飲食不消或臟腑不調心下痞悶。

橘皮　枳實麩炒黃色各壹兩。　白朮貳兩。

右爲極細末荷葉裹燒飯爲丸如梧桐子大一倍大每服五十丸白湯下量所傷加減服之。

除濕益氣丸

治傷濕麵心腹滿悶肢體沉重。

紅花叁分。　蘿蔔子炒熟伍錢。　枳實麩炒黃色。

黃芩生用。　神麯炒黃色。　白朮已上各壹兩。

右同爲細末荷葉裹燒飯爲丸如梧桐子大一倍大每服五十丸白湯下量所傷加減服之。

除濕散

治傷馬妳子幷牛羊酪水一切冷物。

甘草炙。　紅花已上各貳錢。　半夏湯洗七次。

乾生薑已上各叁錢。　車前子　澤瀉已上各伍錢。
茯苓柒錢。　神麯炒黃色壹兩。

右爲極細末。每服三錢匕。白湯調下。食前。

升麻黃連丸

治多食肉口臭。不欲聞其穢惡氣。使左右不得近。

白檀貳錢。　生甘草叁錢。　生薑取自然汁。
蓮花青皮　升麻已上各伍錢。　黃連去鬚壹兩。
黃芩去腐酒洗貳兩。

右爲極細末。湯浸餘餅爲丸。如彈子大。每服一丸。細嚼白湯下。食後。

上二黃丸

治傷熱食痞悶。兀兀欲吐。煩亂不安。

甘草貳錢。　升麻　柴胡已上各叁錢。
黃連酒洗壹兩。　黃芩貳兩。

一方加

枳實伍錢。

右爲細末。湯浸餘餅爲丸。如菉豆大。每服五十丸。白湯下。食遠。

治傷冷飲者以五苓散。每服二錢三錢匕。加生薑煎服之。

治傷食兼傷冷飲者。煎五苓散送半夏枳朮丸。

治傷冷飲不惡寒者。腹中亦不覺寒。惟覺悶。身重食不化者。或小便不利。煎去桂五苓散。依前斟酌服之。

瓜蒂散

上部有脉。下部無脉。其人當吐不吐者死。何謂下部無脉。此謂木鬱也。飲食過飽。塡塞胸中。胸中者。太陰之分。野經曰。氣口反大於人迎三倍。食傷太陰。故曰木鬱則達之。吐者是也。

瓜蒂　赤小豆已上各等分

右二味爲極細末。每服二錢匕。溫漿水調下。取吐爲度。若不至兩手尺脉絕無。不宜便用此藥。恐損元氣。令人胃氣不復。若止是胸中窒塞悶亂不通。以指探去之。如不得吐者。以物探去之。得吐則已。如食不去。用此藥吐之。解云。盛食塡塞於胸中。爲之窒塞。兩寸脉當主事。兩尺脉不見。其理安在。胸中有食。故以吐出之。食者物也。物者坤土也。是足太陰之號也。胸中者肺也。爲物所塡。肺者手太陰金也。金主殺伐也。與坤土俱在於上而旺於天。金能尅木。故肝木生發之氣。伏於地下。非木鬱而何。吐去上焦陰土之物。木得舒暢。則鬱結去矣。食塞於上。脉絕於下。若不明天地之道。無由達此至理。水火者。陰陽之徵兆。天地之別名也。故曰獨陽不生。獨陰不長。天之用在於地下。則萬物生長矣。地之用在於天上。則

萬物收藏矣。此乃天地交而萬物通也。此天地相根之道也。故陽火之根。本於地下。陰水之源。本於天上。故曰水出高源。故人五臟主有形之物。物者陰也。陰者水也。右三部脈主之偏見於寸口。食塞其上。是絕五臟之源。源絕則水不下流。兩尺竭絕。此其理也。何疑之有。假令所傷前後不同。以分爲率。傷熱物二分。傷生冷硬物一分。用寒藥三黃丸二停。熱藥巴豆三稜丸一停。合而服之。如熱物傷少而寒物傷多。則寒藥少而熱藥多也。假令夏月大熱之時。傷生冷硬物。當用熱藥巴豆三稜丸治之。須加三黃丸。謂天時不可伐。故加寒藥以順時令。若熱物只用三黃丸。何謂此三黃丸時藥也。假令冬天大寒之時。傷羊肉濕麵等熱物。當用三黃丸治之。須加熱藥少許。草豆蔻丸之類是也。爲引用又爲時藥。經云。必先歲氣。無伐天和。此之謂也。餘皆倣此。

消渴門

消渴論

陰陽別論云。二陽結謂之消。脈要精微論云。癉成爲消中。夫二陽者。陽明也。手陽明大腸主津。病消則目黃口乾。是津不足也。足陽明胃主血。熱則消穀善飢。血中伏火。乃血不足也。結者津液不足。結而不潤。皆燥熱爲病也。此因數食甘美而多肥。故其氣上溢。轉爲消渴。治之以蘭除陳氣也。不可服膏粱芳草石藥。其氣慄悍。能助燥熱也。越人云。邪在六腑。則陽脈不和。陽脈不和。則氣留之。氣留之。則陽脈盛矣。陽脈大盛。則陰氣不得營也。故皮膚肌肉消削是也。經云。凡治消癉仆擊偏枯痿厥氣滿發逆肥貴人。則膏粱之

疾也。岐伯曰。脈實病久可治。脈弦小。病久不可治。後分爲三消。高消者舌上赤裂。大渴引飲。逆調論云。心移熱於肺。傳於膈。消者是也。以白虎加人參湯治之。中消者善食而瘦。自汗。大便硬。小便數。叔和云。口乾饒飲水。多食肌亦虛。癉成消中者是也。以調胃承氣三黃丸治之。下消者煩躁引飲。耳輪焦乾。小便如膏。叔和云。焦煩水易虧。此腎消也。以六味地黃丸治之。總錄所謂末傳能食者必發腦疽背瘡。不能食者必傳中滿鼓脹。皆謂不治之證。潔古老人分而治之。能食而渴者。白虎加人參湯。不能食而渴者。錢氏方白朮散倍加葛根治之。上中既平。不復傳下消矣。前人用藥。厥有旨哉。或曰。末傳瘡疽者。何也。此火邪勝也。其瘡痛甚而不潰。或赤水者是也。經云有形而不痛。陽之類也。急攻其陽。無攻其陰。治在下焦。元氣得強者生。失強者死。末傳中滿者。何也。以寒治熱。雖方士不能廢其繩墨而更其道也。然臟腑有遠近。心肺位近。宜制小其服。腎肝位遠。宜制大其服。皆適其至所爲故如過與不及。皆誅罰無過之地也。如高消中消制之太急速。過病所久而成中滿之病。正謂上熱未除。中寒復生者也。非藥之罪。失其緩急之制也。處方之制。宜加意焉。

和血益氣湯

治口乾舌乾。小便數。舌上赤脈。此藥生津液。除乾燥。生肌肉。

柴胡　炙甘草　生甘草（此味治口乾舌乾也。）

麻黃根（已上各叁分。）　酒當歸梢肆分。　酒知母

酒漢防己
酒生地黃柒分.
升麻已上各壹錢.
紅花少許.
羌活已上各伍分.
酒黃連捌分.治舌上赤脈也.
杏仁
石膏陸分治小便赤色.
酒黃檗
桃仁已上各陸箇.
右㕮咀.都作一服.水二大盞.煎至一盞.去柤溫服.忌熱濕麵酒醋等物.

當歸潤燥湯
治消渴.大便閉澀.乾燥結硬.兼喜溫飲.陰頭退縮.舌燥口乾.眼澀難開.及於黑處見浮雲.
細辛壹分.
熟地黃已上各叁分.
知母
當歸身
荆芥穗已上各壹錢.
杏仁陸箇.
生甘草
柴胡柒分.
石膏
麻子仁
升麻壹錢伍分.
小椒叁箇.
炙甘草
黃檗
桃仁泥口.
防風
紅花少許.
右㕮咀.都作一服.水二大盞.煎至一盞.去柤熱服.食遠.忌辛熱物.

生津甘露湯一名清涼飲子.

治消中能食而瘦。口舌乾。自汗。大便結燥。小便頻數。

升麻肆分。　防風
漢防己　生地黃已上各伍分。
柴胡　羌活
黃芪　酒知母
酒龍膽草　石膏
紅花少許。　桃仁伍箇。

右㕮咀。都作一服。水二盞。酒一匙。煎至一盞。稍熱服。食遠。

辛潤緩肌湯一名清神補氣湯。

前消渴證纔愈。止有口乾。腹不能努。此藥主之。

生地黃　細辛已上各壹分。
石膏肆分。　黃檗酒製。
生甘草　知母已上各伍分。
當歸身　荊芥穗
防風已上各壹錢。　升麻壹錢伍分。

生甘草
當歸身陸分。
炙甘草
酒黃芩已上各壹錢。
黃檗已上各壹錢伍分。
杏仁拾箇。

熟地黃叁分。
黃連酒製。
柴胡柒分。
桃仁
紅花少許。

杏仁陸箇　小椒貳箇

右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞食遠稍熱服之

甘草石膏湯

渴病久愈又添舌白沫微腫咽喉嚥津覺痛嗌腫時時有渴喜冷飲口中白沫如膠

生地黃　細辛已上各壹分　熟地黃

黃連已上各叁分　甘草伍分　石膏陸分

柴胡柒分　黃檗　知母

當歸身　桃仁炒去皮尖　荊芥穗

防風已上各壹錢　升麻壹錢伍分　紅花少許

杏仁陸箇　小椒貳箇

右如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞食後温服

甘露膏一名蘭香飲子

治消渴飲水極甚善食而瘦自汗大便結燥小便頻數

半夏貳分湯洗　熟甘草　白豆蔻仁

人參　蘭香　升麻

連翹　桔梗已上各伍分　生甘草
防風已上各壹錢　酒知母壹錢伍分　石膏叁錢

右爲極細末。湯浸餌餅。和勻成劑。捻作薄片子。日中晒半乾。擦碎如米大。每服二錢。淡生薑湯送下。食後。

生津甘露飲子

治消渴上下齒皆麻。舌根強硬腫痛。食不能下。時有腹脹。或瀉黃如糜。名曰餐泄。渾身色黃。目睛黃甚。四肢痿弱。前陰如冰。尻髀腰背寒。面生黧色。脊下急痛。善嚏。喜怒健忘。

霍香貳分　柴胡　黃連
木香已上各叁分　白葵花　麥門冬
當歸身　蘭香已上各伍分　葦澄茄
生甘草　山梔子　白豆蔻仁
白芷　連翹　姜黃已上各壹錢
石膏壹錢貳分　杏仁去皮　酒黃蘗已上各壹錢伍分
炙甘草　酒知母　升麻
人參已上各二錢　桔梗叁錢　全蝎二箇去毒

右爲細末。湯浸餘餅。和勻成劑。捻作片子。日中晒半乾。擦碎如黃米大。每服二錢。津唾下。或白湯送下。食遠服。

眼耳鼻門

諸脈者皆屬於目論

陰陽應象論云。諸脈者皆屬於目。目得血而能視。五臟六腑精氣皆上注於目。而爲之精。精之窠爲眼。骨之精爲瞳子。筋之精爲黑眼。血之精爲絡。其窠氣之精爲白眼。肌肉之精則爲約束。裹撷筋骨血氣之精而與脈幷爲系。上屬於腦後出於項中。故邪中於項。因逢其身之虛。其入深則卽陷眼系。入於腦則腦轉。腦轉則引目系急。目系急則目眩以轉矣。邪中其精。其精所中。不相比也。則精散。精散則視岐。故見兩物。目者五臟六腑之精。榮衞魂魄之所常營也。神氣之所主也。故神勞則魂魄散。志意亂。是故瞳子黑眼法於陰。白眼赤脈發於陽。故陰陽合傳而爲精明也。目者心之使也。心者神之舍也。故神精亂而不轉。卒然見非常之處。精神魂魄散不相得。故曰惑也。夫十二經脈。三百六十五絡。其血氣皆上走於面而走空竅。其清陽氣上散於目而爲精。其氣走於耳而爲聽。因心事煩冗。飲食失節。勞役過度。致脾胃虛弱。心火大盛。則百脈沸騰。血脈逆行。邪害空竅。天明則日月不明矣。夫五臟六腑之精氣。皆稟受於脾。上貫於目。脾者諸陰之首也。目者血脈之宗也。故脾虛則五臟之精氣皆失所司。不能歸明於目矣。心者君火也。主人之神。宜靜而安。相火化行其令。相火者包絡也。主百脈皆榮於目。既勞役運動。勢乃妄行。又因邪氣所幷。

而損血脈。故諸病生焉。凡醫者不理脾胃。及養血安神。治標不治本。是不明正理也。

內障眼論

凡心包絡之脈。出於心中。以代心君之行事也。與少陽爲表裏。瞳子散大者。少陰心之脈挾目系。厥陰肝之脈連目系。心主火。肝主木。此木火之勢盛也。其味則宜苦宜酸宜涼。大忌辛辣熱物。以助木火之邪也。飲食中常知此理可也。夫辛主散熱則助火。故不可食。諸酸主收心氣瀉木火也。諸苦瀉火熱則益水也。尤忌食冷水大寒之物。此則能損胃氣不行。則元氣不生。元氣不行。胃氣下流。胸中三焦之火及心火乘於肺上。入腦灼髓。火主散溢。瞳子開大。大熱之物又助火邪。此蓋不可食驗也。藥中云。菟蔚子一味辛及主益睛。辛者是助火也。故去之。乃加黃芩黃連瀉中焦之火。芩能瀉上焦肺中之火。以酒洗之。乃寒因熱用也。又去青箱子爲助陽火也。加五味子以收瞳人開大。且火之與氣勢不兩立。故內經曰。壯火食氣。氣食少火。少火生氣。壯火散氣。諸酸之物。能助元氣。孫眞人云。五月常服五味。助五臟氣。以補西方肺金。法云。以酸補之。以辛瀉之。辛瀉氣則明矣。或曰。藥中有當歸。其味亦辛而甘。其不去者何。此辛甘一味。以其和血之聖藥。況有甘味。又欲以爲鄉導爲諸藥之使耳。

芎辛湯

治兩眼晝夜隱澀難開。羞明惡日。視物昏暗。赤腫而痛。

細辛貳分。　芎藭　蔓荊子已上各伍分。

甘草　白芷已上各壹錢　防風壹錢伍分

右咬咀都作一服。水二盞。煎至一盞。臨臥温服。

碧天丸一名井珠丸。

治目疾累服寒涼藥不愈。兩眼蒸熱。如火之熏。赤而不痛。滿目紅絲。血脈貫睛。昏悶昏暗。羞明畏日。或上下瞼赤爛。或冒風沙而內外皆破。洗之神効。

枯白礬貳分　銅碌柒分研　瓦粉炒黑壹兩

右先研白礬銅碌令細。旋旋入粉同研勻。熟水和之。共爲一百丸。每用一丸。熱湯半盞。浸一二箇時辰。洗至覺微澁爲度。合半時辰許。臨臥洗之。瞑目便睡。一丸可洗十遍。再用湯內坐令熱。此藥治其標。若裏實者不宜用。

廣大重明湯

治兩目瞼赤爛。熱腫疼痛。幷稍赤。及眼瞼痒痛。抓之至破。眼弦生瘡。目多眵淚。隱澁難開。

龍膽草　防風　生甘草

細辛已上各壹錢

右剉如咀。內甘草不剉。只作一錠。先以水一大椀半。煎龍膽一味。至一半。再入餘三味。煎至少半椀。濾去粗。用清帶熱洗。以重湯坐令熱。日用五七次。但洗畢合眼一時。去努肉泛長及痒亦驗。

百點膏

張濟氏眼病醫六年。以至遮瞳人。視物不明。有雲氣之狀。因用此藥而效。

棘仁去皮尖叁分　當歸身　甘草陸分　已上各

防風捌分。

黃連揀治貳錢。剉如麻豆大。水一大椀煎至一半入藥

右件剉如麻豆大。棘仁別研如泥。同熬。滴在水中不散。入去沫蜜少許。再熬少時。爲度。令病人心靜點之。至目中微痛。日用五七次。臨臥點尤疾效。名之曰百點膏。但欲多點。使藥力相繼也。

選奇湯

治眉痛不可忍。

炙甘草夏月生用　羌活　防風已上各叁錢。

酒黃芩壹錢。冬月不用此一味。如能食熟痛倍加之。

右咬咀。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去柤。食後服之。

神効明目湯

治眼瞼緊急。致倒睫拳毛。及上下瞼皆赤爛。睛疼昏暗。晝則冷淚常流。夜則眼澁難開。

細辛貳分。　蔓荊子伍分。　防風壹錢。

葛根壹錢伍分。　甘草貳錢。

一方加

黃芪壹錢.

右咬咀作一服.水二盞.煎至一盞.去柤.稍熱臨臥服.

羌活退翳膏一名復明膏.

治足太陽寒水膜子遮睛.白翳在上.視物不明.

椒樹東南根貳分.西北根貳分.　藁本　漢防己已上各貳分.

黃連　防風　麻黃去根節.已上各

柴胡　升麻　生地黃已上各叁分.

生甘草肆分.　當歸身陸分.　羌活染分.

薏仁陸箇.

右用淨水一大椀.先煎漢防己、黃連、生甘草、當歸、生地黃.煎至一半.下餘藥再煎.至一盞.去柤.入銀石器中再熬之.有力爲度.

明目細辛湯

治兩目發赤.微痛.羞明畏日.怯風寒.怕火.眼瞼成紐.眵糊多.隱澀難開.眉攢腫悶.鼻塞.涕唾稠粘.大便微硬.

川芎伍分。　生地黃酒製。　蔓荊子已上各陸分。
當歸梢　白茯苓　藁本已上各壹錢。
荊芥壹錢貳分。　防風貳錢。　麻黃根
羌活已上各叁錢。　細辛少許。　紅花少許。
椒捌箇。　桃仁貳拾箇。

右咬咀。分作四服。每服水二盞。煎至一盞。去柤稍熱。臨臥服之。忌酒醋濕麵。

復明散

治內瘴。

青皮叁分。　橘皮　川芎
蒼朮已上各伍分。　炙甘草　生地黃
連翹　柴胡已上各壹錢。　黃芪壹錢伍分。
當歸身貳錢。

右剉如麻豆大。都作一服。水二大盞。煎至一盞。去柤稍熱服之。食後。忌酒醋濕麵辛熱大料物之類。

助陽和血湯

治眼發之後。微有上熱。白睛紅。隱澀難開。睡多眵淚。

蔓荊子貳分　香白芷叁分、　柴胡
黃芪　炙甘草　當歸身酒洗、
防風已上各伍分、　升麻柒分、
右咬咀都作一服、水一盞半、煎至八分、去柤、稍熱服、臨臥、避風寒處睡、

吹雲膏

治目中淚及迎風寒泣羞明畏日、常欲閉目、喜在暗室、塞其戶牖、腎瘼歲久遮睛、此藥多點神驗、

細辛壹分、　升麻　連翹
青皮　生甘草　薤仁已上各叁分、
柴胡伍分、　生地黃壹錢　防風肆已上各分、
荊芥穗壹錢、微取濃汁、　當歸身已上各陸分、
右咬咀、除連翹外、用澄清淨水二椀、先熬餘藥至半椀、入連翹同熬至一大盞許、去柤、入銀石器內、文武火熬、滴入水成珠不散爲度、入煉去沫熟蜜少許、熬勻用之、

防風飲子

治倒睫拳毛、

細辛　蔓荊子已上各叁分、　葛根

防風已上各伍分　當歸身柒分　炙甘草
黃連　人參已上各壹錢

右剉如麻豆大。都作一服。水二盞。煎至一盞。食遠服。避風寒。

撥雲湯

戊申六月。徐總管患眼疾。於上眼皮下。出黑白瞖兩箇。隱澀難開。兩目緊縮而無疼痛。兩手寸脈細緊。按之洪大無力。知足太陽膀胱爲命門相火。煎熬逆行。作寒水瞖及寒瘼遮睛。證呵欠善悲。健忘噫噴眵淚。時自淚下。面赤而白。能食。不大便。小便數而欠上而喘。

黃芪壹分　細辛　生薑
葛根　川芎已上各伍分　柴胡柒分
荆芥穗　藁本　生甘草
升麻　當歸身　知母已上各伍錢
羌活　防風　黃蘗已上各壹錢伍分

右咬咀如麻豆大。都作一服。水二盞。煎至一盞。去粗熱服。食後。

神効黃芪湯

治渾身麻木不仁。或頭面手足肘背。或腿脚麻木不仁。並皆治之。如兩目緊急縮小。及羞明畏日。隱澀

難開或視物無力睛痛昏花手不得近或目少精光或目中熱如火服五六次可効

蔓荊子壹錢　陳皮去白伍錢　人參捌錢

炙甘草　白芍藥已上各壹兩　黃芪貳兩

右�once咀每服五錢水二盞煎至一盞去柤臨臥稍熱服

如小便淋瀝加澤瀉伍分一服止則去

如有大熱證每服加酒洗黃檗叁分

如麻木不仁雖有熱不用黃檗止加黃芪壹兩通用三兩也

如眼縮急去芍藥忌酒醋麵大料物葱韭蒜辛物

如麻木甚者加芍藥壹兩通用二兩

圓明內障升麻湯一名冲和養胃湯

治內障眼得之脾胃元氣衰弱心火與三焦俱盛飲食不節形體勞役心不得休息故上爲此疾

乾薑壹錢　五味子貳錢　白伏苓叁錢

防風伍錢　白芍藥陸錢　柴胡柒錢

人參　炙甘草　當歸身酒洗

白朮　升麻　葛根已上各壹兩

黃芪　羌活已上各壹兩伍錢

右咬咀。每服五七錢。水三大盞。煎至二大盞。入黃芩黃連貳錢。同煎數沸。去粗。煎至一盞。熱服。食遠。

黃芩黃連湯

黃芩酒洗。炒。　黃連酒洗。炒。

生地黃各酒洗。壹兩已上

右咬咀。每服二錢。水二盞。煎至一盞。去粗。熱服。

蔓荊子湯

治勞役飲食不節。內障眼病。此方如神効。

蔓荊子貳錢伍分。　黃檗酒拌。炒四遍。

炙甘草捌錢。　黃芪

右咬咀。每服三錢。或五錢。水二盞。煎至一盞。去粗。臨臥溫服。

歸葵湯一名連翹飲子。

治目中溜火。惡日與火。隱澀難開。小角緊。視物昏花。迎風有淚。

柴胡貳分。　生甘草　蔓荊子

連翹　生地黃　當歸身　白芍藥已上各叁錢。　草龍膽酒洗四次。炒四次。　人參已上各壹兩。

紅葵花　人參已上各叁分　黃芪

酒黃芩　防風　羌活已上各伍分

升麻壹錢

右㕮咀。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去粗。食後温服。

救苦湯

治眼暴發。赤腫瞼高。苦疼不任者。

桔梗　連翹　紅花

細辛已上各壹分　當歸身夏月減半　炙甘草已上各伍分

蒼朮　草龍膽已上各柒分　羌活太陽

升麻陽明　柴胡少陽　防風

葉本　黃連已上各壹錢　生地黃

黃蘗　黃芩　知母已上各錢伍分

川芎叁錢

右㕮咀。每服一兩。水二盞。煎至一盞。去粗。食後温服。

若苦疼則多用苦寒者。兼治本經之藥。再行加減。如睛昏加知母黃蘗一倍。

熟乾地黃丸

治血弱陰虛不能著心致心火旺陽火甚瞳子散大少陰爲火君主無爲不行其令相火代之兼心包絡之脈出心系分爲三道少陽相火之體無形其用在其中矣火盛則令母實乙木肝旺是也心之脈挾於目系肝連目系況手足少陽之脈同出耳中至耳上角斜起於目外皆風熱之盛亦從此道而來上攻頭目致偏頭腫悶瞳子散大視物則花此目血虛陰弱故也法當養血涼血益血收火之散大除風之熱則愈矣

人參貳錢　炙甘草　天門冬湯洗去心

地骨皮　五味子　枳殼炒

黃連已上叁錢各　當歸身酒洗焙乾　黃芩已上伍錢各

生地黃錢酒洗柒伍分　柴胡捌錢　熟乾地黃壹兩

右件同爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服一百丸茶湯送下食後日進二服

益陰腎氣丸

此壯水之主以鎮陽光

澤瀉　茯苓已上各貳錢伍分　生地黃酒洗乾

牡丹皮　山茱萸　當歸梢酒洗

五味子　乾山藥　柴胡已上各伍錢。

熟地黃貳兩。

右爲細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。硃砂爲衣。每服五十丸。淡鹽湯下。空心。

羌活退瞖丸

治內障右眼小眥靑白瞖。大眥微顯白瞖。腦痛。瞳子散大。上熱惡熱。大便祕澁。小便如常。遇天氣暄熱。頭痛睛脹。可服此藥。瞖在大眥。加葛根升麻。瞖在小眥。加柴胡羌活是也。

黑附子炮。　寒水石已上各壹錢。　酒防己貳錢。

知母酒炒。　牡丹皮　羌活

川芎已上各叁錢。　酒黃檗　生地黃酒洗炒。

丹參　芜蔚子　酒當歸身

柴胡已上各伍錢。　熟地黃搗錢。　芎藭壹兩叁錢。

右爲細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服五七十丸。白湯下。空心。宿食未消。待饑則服之。藥後省語言。以食壓之。

當歸龍膽湯

治眼中白瞖。

防風　石膏已上各壹錢伍分　柴胡
羌活　五味子　升麻已上各貳錢
甘草　酒黃連　黃芪已上各叁錢
酒黃芩炒　酒黃蘗炒　當歸身酒洗
草龍膽酒洗　芍藥已上各伍錢

右�once咀每服五錢水二盞煎至一盞去柤入酒少許臨臥熱服忌言語

補陽湯

治陽不勝其陰乃陰盛陽虛則九竅不通令青白瞖見於大眥及足太陽少陰經中鬱遏足厥陰肝經氣不得上通於目故青白瞖內阻也當於太陽少陰經中九原之下以益肝中陽氣衝天上行此乃先補其陽後於足太陽太陰標中標者頭也瀉足厥陰肝經火下伏於陽中乃次治也內經云陰盛陽虛則當先補其陽後瀉其陰此治法是也每日清晨以腹中無宿食服補陽湯臨臥服瀉陰丸若天色變經大寒大風幷勞役預日飲食不調精神不足或氣弱俱不可服待體氣和平天氣如常服之先補其陽使陽氣上升通於肝經之末利空竅於目矣

肉桂壹錢去皮　知母炒　當歸身酒洗
生地黃酒炒　白茯苓　澤瀉

陳皮已上各叁錢。
黃芪
羌活
甘草已上各壹兩。

右㕮咀。每服五錢。水二盞。煎至一大盞。去粗。空心服之。

瀉陰火丸一名連蘗益陰丸。

石決明叁錢。炒。存性。
甘草
防風已上各伍錢。
黃連酒炒。

右爲細末。煉蜜爲丸如菉豆大。每服五十丸。至一百丸。茶清下。常多服補陽湯。少服此藥。多則妨飲食。

升陽柴胡湯

肉桂伍分。
防風
陳皮已上各壹錢。

柴胡去苗。壹錢伍分。
白芨
生地黃酒炒。

白芍藥
人參
獨活
柴胡貳兩。

羌活
當歸梢
草決明
黃蘗

防風已上各伍錢。
白朮
熟地黃

獨活
五味子
細黃芩
知母已上各壹兩。

知母酒炒。如大者加作伍錢。
澤瀉
楮實酒炒。微潤。

黃芪　人參　白朮已上各伍錢
甘草梢　當歸身　羌活
熟地黃　獨活　白芍藥已上各壹兩

右剉每服五錢水二盞煎至一盞去粗稍熱食遠服

別合一料煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十丸茶清下每日與前藥各一服食遠不可飽服

如天氣熱加五味子叁錢天門冬去心芍藥楮實已上各伍錢

溫衞湯

治鼻不聞香臭目中流火氣寒血熱冷淚多臍下冷陰汗足痿弱

陳皮　青皮　黃連
木香已上各叁分　人參　甘草炙
白芷　防風　黃蘗
澤瀉已上各伍分　黃芪　蒼朮
升麻　知母　柴胡
羌活已上各壹錢　當歸身壹錢伍分

右都作一服水二盞煎至一盞去粗食遠服之

圓明膏

治勞心過度飲食失節乃生內障及瞳子散大此方收睛圓明

訶子皮（濕紙裹煨）甘草（貳錢已上各）當歸身（叁錢）

柴胡　生地黃　麻黃（去節搗開）

黃連（伍錢已上各）

右七味先以水二椀煎麻黃至一椀掠去沫外六味各咬咀如豆大篩去末入在內同熬滴水中不散爲度入熟蜜少許再熬勤點眼

嗑藥麻黃散

治內外障眼

麻黃（壹兩）當歸身（壹錢）

右二味同爲麤末炒黑色入麝香乳香少許共爲細末含水鼻內嗑之

療本滋腎丸

黃檗（酒炒）知母（酒炒各等分已上）

右爲細末滴水爲丸如梧桐子大每服一百丸至一百五十丸空心鹽白湯下

加味滋腎丸

肉桂叁分。　黃連壹錢。　姜黃壹錢伍分。
苦參叁錢。　苦葶藶酒洗炒。　石膏覺肚冷勿用。
黃檗酒炒。　知母酒炒各伍錢。已上

右爲極細末。打薄麵糊爲丸。如梧桐子大。每服一百丸。空心服。白湯下。食壓之。

退腎膏

治黑白湯

薏仁　升麻已上各叁分。　連翹
防風　青皮已上各肆分。　甘草
柴胡已上各伍分。　當歸身陸分。　荊芥穗壹錢水半盡別浸。
生地黃壹錢伍分。　黃連叁錢。

右用水一椀。入前藥煎至半椀。去粗。更上火煎至半盞。入荊芥水兩匙。入蜜少許。再上火熬勻點之。

龍膽飲子

治疳眼流膿。生疳。腎濕熱爲病。

穀精草　川鬱金　蛇退皮
炙甘草已上各伍分。　麻黃壹錢伍分。　升麻貳錢。

青蛤粉　草龍膽　黃芩炒。
羌活已上叁錢。各
右爲細末。每服二錢。食後溫茶清調服之。

柴胡聰耳湯
治耳中乾結。耳鳴耳聾。
連翹肆錢。　柴胡叁錢。　炙甘草
當歸身　人參已上壹錢。各　水蛭伍分。炒。
麝香少許。另研。　虻蟲叁箇。去翅足。炒。另研。

右除三味別研外。生薑三片。水二大盞。煎至一盞。去粗再下三味。上火煎一二沸。稍熱服。食遠。

羌活退臀湯
治太陽寒水臀膜遮睛。不能視物。
羌活壹兩伍錢。　防風壹兩。
薄荷葉　藁本已上柒錢。各　荊芥穗煎成藥加之。
黃蘗肆錢。　川芎　酒知母伍錢。
酒生地黃壹錢。　小椒伍分。　當歸身已上叁錢。
細辛少許。

麻黃貳錢（用根）

右咬咀。每服三錢。水二大盞。煎至一盞半。入荊芥穗。再煎至一盞。去粗。稍熱服。食遠。忌酒醋濕麵等物。

遠睛紫金丹

治目眶歲久赤爛。俗呼爲赤瞎是也。當以三稜針刺目眶外以瀉濕熱。如眼生倒睫拳毛。兩目緊蓋。內伏火熱。而攻陰氣。法當去其熱內火邪。眼皮緩則毛立出。瞖膜亦退。用手法攀出內瞼向外。以針刺之出血。

白沙蜜貳拾兩　甘石拾兩（燒七遍碎。連水浸拌。）　黃丹陸兩（水飛。）

揀連翹壹兩（小便浸碎爲末。）　南乳香　當歸已上各壹錢。

烏魚骨貳錢。　礬砂（小盞內放於瓶口上熏乾。）　麝香已上各壹錢。

白丁香（直者伍分。）　輕粉壹字。

右將白沙蜜於沙石器內慢火去沫。下甘石。次下丹。以柳枝攪。次下餘藥。以粘手爲度。作丸如雞頭大。每用一丸。溫水化開洗。

麗澤通氣湯

治鼻不聞香臭。

黃芪肆錢。

獨活　防風　升麻
葛根已上各叁錢．　炙甘草貳錢．　麻黃不去節．冬月加．
川椒　白芷已上各壹錢．
右咬咀．每服五錢．生薑三片．棗二枚．葱白三寸．同煎至一盞．去粗溫服．食遠．忌一切冷物及風寒涼處坐臥行立．

溫肺湯
治鼻不聞香臭．眼多眵淚．
丁香貳分．　防風　炙甘草
葛根　羌活已上各壹錢．　升麻
黃芪貳錢．　麻黃不去節肆錢．
右爲麤末．水二盞．葱白三根．煎至一盞．去粗．食後服．

禦寒湯
治寒氣風邪傷於毛皮．令鼻壅塞．欬嗽上喘之證．
黃連　黃檗　羌活已上各貳分．
炙甘草　佛耳草　款冬花

白芷　防風已上各叁分.
人參　陳皮已上各伍分.
黃芪壹錢.

右㕮咀.都作一服.水二盞.煎至一盞.去柤.食後熱服.

升麻
蒼朮柒分.

蘭室秘藏卷中

頭痛門

頭痛論

金匱眞言論云東風生於春病在肝俞在頸項故春氣者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽膀胱之脈起於目內眥上入絡腦還出別下項病衝頭痛又足少陽膽之脈起於目銳眥上抵頭角病則頭角額痛夫風從上受之風寒傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛耳鳴九竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者病在耳中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也如氣上不下頭痛巔疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也如頭半邊痛者先取手少陽陽明後取足少陽陽明此偏頭痛也有眞頭痛者甚則腦盡痛手足寒至節死不治有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓者以腦爲主腦逆故令頭痛齒亦痛凡頭痛皆以風藥治之者總其大體而言之也高顛之上惟風可到故味之薄者陰中之陽乃自地升天者也然亦有三陰三陽之異故太陽頭痛惡風脈浮緊川芎羌活、獨活、麻黃之類爲主少陽經頭痛脈弦細往來寒熱柴胡爲主陽明頭痛自汗發熱惡寒脈浮緩長實者升麻葛根、石膏白芷爲主太陰頭痛必有痰體重或腹痛爲痰癖其脈沉緩蒼朮、半夏、南星爲主少陰經頭痛三陰三陽經不流行

而足寒氣逆爲寒厥。其脈沉細。麻黃、附子、細辛爲主。厥陰頭項痛。或吐痰沫厥冷。其脈浮緩。吳茱萸湯主之。血虛頭痛。當歸、川芎爲主。氣虛頭痛。人參、黃芪爲主。氣血俱虛頭痛。調中益氣湯。少加川芎、蔓荊子、細辛。其効如神。白朮半夏天麻湯。治痰厥頭痛藥也。青空膏。乃風濕熱頭痛藥也。羌活附子湯。治厥陰頭痛藥也。如濕氣在頭者。以苦吐之。不可執方而治。先師嘗病頭痛。發時兩頰青黃。暈眩。目不欲開。懶言。身體沉重。兀兀欲吐。潔古曰。此厥陰太陰合病。名曰風痰。以局方玉壺丸治之。更灸俠谿穴即愈。是知方者體也。法者用也。徒執體而不知用者弊。體用不失。可謂上工矣。

清空膏

治偏正頭痛。年深不愈者。善療風濕熱□上壅損目及腦痛不止。

川芎伍錢。　柴胡柒錢。　黃連炒。
防風去芦。　羌活已上各壹兩。　炙甘草壹兩伍錢。
細挺子黃芩參兩去皮。剉。一半酒製。一半炒。

右爲細末。每服二錢七。於盞內入茶少許。湯調如膏。抹在口內。少用白湯送下。臨臥。

如苦頭痛。每服加細辛貳分。

如太陰脈緩有痰。名曰痰厥頭痛。減羌活、防風、川芎、甘草。加半夏壹兩伍錢。

如偏正頭痛。服之不愈。減羌活、防風、川芎一半。加柴胡壹倍。

如發熱惡熱而渴。此陽明頭痛。只與白虎湯。加好吳白芷。

徹清膏

蔓荊子　細辛已上各壹分。
川芎已上各叁分。　生甘草
藁本壹錢。　薄荷葉　熟甘草已上伍分。

右爲細末。每服二錢。食後茶清調下。

川芎散

治頭目不清利。

川芎叁分。　柴胡柒分。
防風　藁本。
升麻已上各壹錢。　熟甘草　羌活
酒黃連炒。　酒黃芩已上各肆錢伍分。　生甘草
酒生地黃貳錢。

右爲細末。每服一錢。或二三錢。食後茶清調下。忌酒濕麵。

白芷散一名鬱金散。

治頭痛。

鬱金壹錢.　香白芷　芒硝已上各叁錢.　石膏已上各貳錢.
薄荷葉

右爲極細末.口含水鼻內嗑之.

碧雲散

治頭痛.

細辛　鬱金　芒硝已上各壹錢.
蔓荊子　川芎已上各貳錢貳分.　石膏叁錢貳分.
青黛壹錢伍分.　薄荷葉貳錢.

右爲極細末.口噙水鼻內嗑之.

羌活清空膏

蔓荊子壹錢.　黃連叁錢.　羌活
防風　甘草肆已上各錢.　黃芩壹兩.

右爲細末.每服一錢.茶清調下.食後臨臥.

清上瀉火湯

昔有人年少時氣弱.常於氣海三里炙之.節次約五七十壯.至年老添熱厥頭痛.雖冬天大寒.猶喜寒

風。其頭痛則愈。微來暖處。或見烟火。其痛復作。五七年不愈。皆灸之過也。

荆芥穗　川芎已上各貳分。　蔓荆子
當歸身　蒼朮已上各叁分。　酒黃連
生地黃　藁本　甘草已上各伍分。
升麻　防風已上各柒分。　酒黃蘗
炙甘草　黃芪已上各壹錢。　酒黃芩
酒知母已上各錢伍分。　羌活叁錢。　柴胡伍錢。
細辛少許。　紅花少許。

右剉如麻豆大。分作二服。每服水二盞。煎至一盞。去柤。稍熱服。食後。

補氣湯

服前藥之後。服此藥。

柴胡貳分。　升麻叁分。　黃芪捌分。
當歸身貳錢。　炙甘草肆錢。　紅花少許。

右㕮咀。作二服。水二盞。煎至一盞。去柤。稍熱服。食後。

細辛散

治偏正頭痛。

細辛　瓦粉已上各貳分。
芎藭已上各伍分。　酒黃連
炒黃芩　酒黃芩已上各壹錢。
柴胡貳錢。

右爲麤末。每服三錢。水一大盞半。煎至一盞。取清。食後服之。

羌活湯

治風熱壅盛上攻。頭目昏眩。

炙甘草柒分。　澤瀉叁錢。　生黃芩
白茯苓　酒黃檗已上各伍錢。　川芎已上各柒分。
細黃芩酒洗。　炙甘草壹錢伍分。
防風　酒洗瓜蔞根
羌活已上各壹兩。　柴胡柒錢。
酒黃連

右爲麤末。每服五錢重。水二大盞。煎至一盞。取清。食後臨臥。通口熱服之。

養神湯

治精神短不得睡。項筋腫急難伸。禁甘溫。宜苦味。

木香
酒黃芩貳分
白朮
蒼朮
黃連已上各伍分
黃芪壹錢
右咬咀每服五錢水二大盞煎至一盞去粗稍熱服不拘時候
安神湯
治頭痛頭旋眼黑
生甘草
柴胡
酒知母已上各伍錢
黃芪貳兩
右爲麤末每服五錢水二大盞半煎至一盞半加蔓荆子五分川芎三分再煎至一盞去粗臨臥熱服
半夏白朮天麻湯

橘皮
人參
川芎已上各叁分
麥蘗麵
甘草
炙甘草已上各貳錢
升麻
酒黃蘗

柴胡已上各壹分
黃蘗
升麻肆分
當歸身
半夏已上各柒分
防風貳錢伍分
酒生地黃
羌活已上各壹兩

范天騭之內有脾胃證。時顯煩躁。胸中不利。大便不通。而又爲寒氣怫鬱。悶亂大作。火不伸故也。疑其有熱。服疎風丸。大便行。其病不減。恐其藥少。再服七八十丸。大便復見兩行。元證不瘳。增以吐逆。食不能停。痰唾稠粘。湧出不止。眼黑頭旋。惡心煩悶。氣短促上喘。無力以言。心神顛倒。目不敢開。如在風雲中。頭苦痛如裂。身重如山。四肢厥冷。不得安臥。余料前證是胃氣已損。復下兩次。則重虛其胃。而痰厥頭痛作矣。與此藥而治之。

黃蘗貳分。酒洗。　乾薑叁分。　澤瀉

白茯苓　天麻　黃芪

人參　蒼朮已上各伍分。　炒神麴

白朮已上各壹錢。　麥蘗麵　半夏湯洗。

橘皮已上各壹錢伍分。

右咬咀。每服五錢。水二大盞。煎至一盞。去粗熱服。食前。一服而愈。此頭痛苦甚。謂之足太陰痰厥頭痛。非半夏不能療眼黑頭旋。風虛內作。非天麻不能除。黃芪甘溫。瀉火補元氣。實表虛。止自汗。人參甘溫。瀉火補中益氣。二朮俱苦甘溫。除濕補中益氣。澤瀉、茯苓利小便。導濕。橘皮苦溫。益氣調中升陽。神麴消食。蕩胃中滯氣。大麥麵寬中助胃氣。乾薑辛熱。以滌中寒。黃蘗大苦寒。酒洗。以療冬天少火在泉發躁也。

口齒咽喉門

口齒論

論曰。夫齒者腎之標。口者脾之竅。諸經多有會於口者。其牙齒是手足陽明之所過。上齦隸於坤土。乃足陽明胃之脈貫絡也。止而不動。下齦嚼物。動而不休。手陽明大腸之脈所貫絡也。手陽明惡寒飲而喜熱。足陽明喜寒飲而惡熱。其病不一。牙者腎之標。亦喜寒。寒者堅牢。爲病不同。熱甚則齒動。齦斷袒脫。作痛不已。故所治療不同也。有惡熱而作痛者。有惡寒而作痛者。有惡寒惡熱而作痛者。有惡寒飲少熱飲多而作痛者。有惡熱飲少寒飲多而作痛者。有牙齒動搖而作痛者。有齒齦腫起爲痛者。有脾胃中有風邪。但覺風而作痛者。又有牙上多爲蟲所蝕。其齒缺少而色變爲蟲牙痛者。有胃中氣少。不能於寒袒露其齒作痛者。有牙齒疼痛。而穢臭之氣不可近者。痛既不一。豈可一藥而盡之哉。

羌活散

治客寒犯腦。風寒濕腦。痛項筋急。牙齒動搖。肉齦袒脫疼痛。

藁本　香白芷　升麻已上各伍分。
蒼朮　羌活壹錢。
草豆蔻仁壹錢。
麻黃去根節。　防風已上各叁錢。
桂枝已上各叁分。
當歸身陸分。
羊脛骨灰貳錢。
柴胡伍錢。

細辛少許。

右爲細末。先用温水嗽口。淨擦之。其痛立止也。

草豆蔻散

治寒多熱少。牙齒疼痛。

羊脛骨灰　草豆蔻仁

細辛葉　防風已上各貳分。

熟地黃已上各伍分。　當歸陸分。

黃連已上各壹錢叁分。　升麻貳錢伍分。

右爲細末。同前牙痛處擦之。

麻黃散

治冬寒時分寒濕腦痛。項筋急。牙齒動搖疼痛。

羊脛骨灰　草豆蔻仁　羌活壹錢伍分。　生地黃已上貳錢。

防風　藁本已上各叁分。

當歸身　熟地黃已上各陸分。

升麻　黃連已上各壹錢。

麻黃不去節。　草龍膽酒洗。

細辛少許。

右爲細末依前藥法擦之

熱牙散一名麝香散

治大熱牙齒痕露根肉齦脫血出齒動欲落疼痛妨食物餚反忤熱多

熟地黃貳分　生地黃　人參叁分已上各　黃連伍分已上各壹　益智仁貳分半　麻黃根　升麻壹錢　羊脛骨皮貳錢　當歸身　酒漢防己　草豆蔻　麝香少許

右爲細末如前藥擦之

治蟲散一名白芷散

治大寒犯腦牙齒疼痛及蟲痛胃經濕熱腫痛

桂枝壹分　白芷叁分已上各　黃連肆分已上各　草豆蔻　熟地黃貳分　當歸身　羌活伍分　黃芪　麻黃不去節叁錢五分　蘗本　益智仁　吳茱萸捌分　升麻壹錢已上各　羊脛骨灰貳錢

右爲細末。同前擦之。

益智木律散

治寒熱牙痛。

木律貳分。

羊脛骨灰

草豆蔻皮貳錢壹分。

右爲細末。用度如前擦之。

如寒牙痛。不用木律。

蠍梢散

治大寒風犯腦。牙痛。

白芷

桂枝

藁本

草豆蔻皮壹錢。

蠍梢少許。

當歸

益智皮

升麻壹錢伍分。

當歸身

升麻

黃芪叁分。已上各

麻黃去節。壹錢伍分。

黃連肆分。已上各

熟地黃伍分。已上

柴胡貳分。已上各

防風

羌活伍分。

羊脛骨灰貳錢伍分。

右爲細末。如前法用之。

白牙散

白芷染分。　升麻壹錢。

羊脛骨灰貳錢。　麝香少許。

右爲細末。先用温水嗽口。擦之妙。

刷牙藥

麝香壹分。　生地黃

熟地黃已上各貳分。　當歸身

草豆蔻皮伍分。　升麻壹錢。

黃連已上各貳錢。　白豆蔻

沒石子叁箇。　五倍子壹箇。

右爲極細末。如前法擦之。妙。

獨聖散

治一切牙痛風疳。

北地蒺藜不以多少。陰乾。　石膏壹錢伍分。　酒防己

人參已上各叁分。

羊脛骨灰

草豆蔻已上叁錢。

右爲細末。每用刷牙。以熱漿水漱牙外。齦末熬漿水刷牙。大有神効。不可具述。

當歸龍膽散

治寒熱停牙痛。

當歸梢　羊脛骨灰
香白芷　麻黃　草豆蔻皮
生地黃已上各伍分。　升麻　黃連已上各壹錢。
草龍膽

右爲細末。如前法擦之。神効。

牢牙地黃散

治腦寒痛及牙痛。

生地黃　熟地黃
葉本貳分。　防己　人參已上各叁分。
羌活　益智仁已上各肆分。　香白芷
當歸身　羊脛骨灰　吳茱萸
黃芪已上各伍分。　麻黃已上各壹錢。　草豆蔻皮壹錢貳分。
黃連
升麻壹錢伍分。

右爲細末。如前法擦之。

細辛散

治寒邪風邪犯腦。牙齒痛。

柴胡　防風
白芷已上各貳分。　桂枝半貳分
藁本　蒼朮已上各叁分。
草豆蔻伍分。　羊脛骨灰
細辛少許。

右爲細末。先漱後擦之。佳。

立効散

治牙齒痛不可忍。及頭腦項背微惡寒。飲大惡熱飲。其脈上中下三部。陽虛陰盛。是五臟內盛。六腑陽道脈微小。小便滑數。

細辛貳分。　炙甘草叁分。　升麻柒分。
防風壹錢。　草龍膽肆錢酒洗。

右咬咀。都作一服。水一盞。煎至七分。去粗。以匙抄在口中煤痛處。待少時則止。

如多惡熱飲。更加草龍膽。壹錢。此法不定。隨寒熱多少。臨時加減。若更惡風作痛。加草豆蔻黃連。已上各伍分。勿加草龍膽。

牢牙散

治牙齦肉綻有根。牙疳腫痛。牙動搖欲落。牙齒不長。牙黃口臭。

羌活壹兩。　草龍膽酒洗。壹兩伍錢。　羊脛骨灰貳兩。

升麻肆兩。

右爲細末。以紗羅子羅骨灰作微塵末和勻。臥時貼在牙齦上。

清胃散

治因服補胃熱藥。致使上下牙疼痛不可忍。牽引頭腦。滿面發熱。大痛。足陽明之別絡入腦。喜寒惡熱。乃是手陽明經中熱盛而作也。其齒喜冷惡熱。

當歸身　　擇細黃連。如連不好。更加貳分。夏月倍之。　生地黃。酒製。已上叁分。

牡丹皮伍分。　升麻壹錢。

右爲細末。都作一服。水一盞半。煎至一盞。去柤。帶冷服之。

神功丸

治多食肉人口臭不可近。牙齒疳蝕。牙縫肉將脫。牙齒落血不止。

蘭香葉（如無蜜香代之）　當歸身　藿香（用葉）

木香（已上各壹錢）　升麻（貳錢）　生地黃（酒洗）

生甘草（已上各叁錢）　黃連（去鬚擇淨酒洗秤）　縮砂仁（已上各伍錢）

右同爲細末湯浸餌爲丸如菉豆大每服一百丸或加至二百丸止白湯下食遠服兼治血痢及血崩及血下不止血下褐色或紫色黑色及腸澼下血空心服米湯下其脈洪大而緩者及治麻木厥氣上衝逆氣上行忘聞忘見者

桔梗湯

治咽腫微覺痛聲破

當歸身　馬勃（壹分已上各）

黃芩（叁分已上各）　麻黃（伍分去節不）　白殭蠶

甘草（壹錢已上各）　桔梗

桂枝（少許）

右爲麤末作一服水二大盞煎至一盞去柤稍熱服之食後

又方

治口瘡久不愈者

黃蘗（不計多少眞者蜜塗其上炙黃色）

右爲細末。乾糝瘡上。臨臥忌醋醬鹽。

神驗法

治口瘡。無問久新。

夜間將二丸以勒緊左右交手揉三五十次。但遇睡覺行之。如此三五度。因濕而生者一夜愈。久病諸般口瘡三二夜愈。如鼻流清涕者。勒之二丸。揉之數夜可愈。

內經云。膀胱移熱於小腸。膈腸不便。上口爲糜。易老五苓散與導赤散合而飲之。

嘔吐門

丁香茱萸湯

治嘔吐噦胃。虛寒所致。

黃檗叁分　炙甘草　丁香

柴胡　橘皮已上各伍分　升麻柒分

吳茱萸　蒼朮　人參已上各壹錢

當歸身壹錢伍分　草豆蔻仁　黃芪已上各貳錢

右爲麤末。每服五錢。水二大盞。煎至一盞。去粗。稍熱服。食前。

白朮湯一名茯苓半夏湯。

治胃氣虛弱。身重有痰。惡心欲吐。是風邪羈絆於脾胃之間。當先實其脾胃。

炒神麴貳錢。　陳皮　天麻已上各叁錢。炒黃麥蘗麵色。

白朮　白茯苓

半夏已上各伍錢。

右咬咀。每服五錢。水二盞。入生薑五片。同煎至一盞。去粗。稍熱服之。

補肝湯一名柴胡半夏湯。

治素有風證。不敢見風。眼澀頭痛。眼黑。胸中有痰。惡心兀兀欲吐。遇風但覺皮肉緊。手足難舉重物。如居暖室。少出微汗。其證乃減。再或遇風。病卽復。

柴胡　升麻　藁本已上各伍分。

白茯苓柒分。　炒神麴　蒼朮已上各壹錢。

半夏貳錢。

生薑拾片。

右爲麤末。都作一服。水二大盞。煎至一大盞。去粗。稍熱服。

吳茱萸丸一名木香利膈丸。

治寒在膈上。噎塞咽膈不通。

木香　青皮已上各貳分。　白殭蠶

姜黃　澤瀉　柴胡已上各肆分
當歸身　炙甘草已上各陸分　益智仁
人參　橘皮　升麻
黃芪已上各捌分　半夏壹錢　草豆蔻仁
吳茱萸已上各錢貳分　麥蘗麵壹錢伍分

右爲細末。湯浸餘餅爲丸。如菉豆大。每服二三十丸。溫水送下。勿多飲湯。恐速下。細嚼亦得。

衄血吐血門

麥門冬飲子

治吐血久不愈。以三稜鍼於氣街出血立愈。

黃芪壹錢　麥門冬　當歸身
生地黃　人參已上各伍分　五味子拾箇

右爲麤末。都作一服。水二盞。煎至一盞。去粗熱服。不拘時。

人參飲子

治脾胃虛弱。氣促氣弱。精神短少。衄血吐血。

麥門冬貳分　人參去芦　當歸身已上各叁分

黃芪　白芍藥　甘草壹已上各錢。

五味子伍箇。

右爲麤末。卽作一服。用水二盞。煎至一盞。去柤稍熱服。

一貧者有前證。以前藥投之愈。繼而至冬天居曠室中。臥大熱炕而吐血數次。再來求治。料此病久虛弱。附臍有形而有火熱在內。上氣不足。陽氣外虛。當補表之陽氣。瀉其裏之虛熱。是其法也。冬天居曠室。衣蓋單薄。是重虛其陽。表有大寒。裏渴裏熱。火邪不得舒伸。故血出於口。憶仲景傷寒論中一證。太陽傷寒。當以麻黃湯發汗。而不與之。遂成衄卻與麻黃湯立愈。此法相同。予遂用之。

三黃補血湯

治六脈俱大按之空虛。心面赤。善驚上熱。乃手少陰心脈也。此氣盛多而亡血。以甘寒鎮墜之劑大瀉其氣。以墜氣浮。以甘辛口微苦峻補其血。

牡丹皮　黃芪　升麻已上各壹錢。

當歸　柴胡已上各壹錢伍分。　熟地黃

川芎已上各貳錢。　生地黃叁錢。　白芍藥伍錢。

右咬咀。如麻豆大。每服五錢。水二大盞。煎至一大盞。去柤。稍熱服。食前。

如兩寸脈乾。血在上焦。或衄血。或嘔血。與犀角地黃湯則愈。

救脈湯一名人參救肺散。

治吐血

甘草　蘇木　陳皮已上各伍分。

升麻　柴胡　蒼朮已上各壹錢。

當歸梢　熟地黃　白芍藥

黃芪　人參已上各貳錢。

右爲麤末。都作一服。水二大盞。煎至一盞。去柤。稍温。食前服。

麻黃桂枝湯

人參益上焦元氣不足而實其表也。　麥門冬保肺氣已上各叁分。　桂枝以補表虛。

當歸身和血養血各伍分。　麻黃去根節。　甘草補其脾胃之虛。

黃芪實表益衛。　白芍藥已上各壹錢。　五味子伍箇安其脈氣。

右以水三盞。先煎麻黃一味。令沸去沫。至二盞入餘藥同煎至一盞。去柤熱服。臨臥只一服而愈。更不再作。

黃芪芍藥湯

治鼻衄血多。面黃。眼澀多眵。手麻木。

葛根　羌活已上各伍錢.

炙甘草貳兩.　白芍藥　升麻已上各壹兩.　黃芪叁兩.

右咬咀.每服伍錢.水二盞.煎至一盞.食後.

六脈弦細而濇.按之空虛.其色必白而天不澤者.脫血也.此大寒證.以辛温補血益血.以甘温甘熱滑潤之劑以佐之.則愈.此亡血亦傷精氣.

止衄血法

治鼻血久不止.素有熱而暴作者.諸藥無驗.神法以大紙一張.作八摺或十摺.於水內濕置頂中.以熱熨斗熨至一重或二重.紙乾立止.

腰痛門

川芎肉桂湯

丁未冬.曹通甫自河南來.有役人小翟露宿寒濕之地.腰痛不能轉側.兩脇搶急作痛.已經月餘不愈.夫腰痛論中說皆爲足太陽足少陰血絡中有凝血作痛.間有一二證屬少陽膽經外絡脈病.皆去血絡之凝.乃愈.其內經有云.冬三月禁不得用鍼.只宜服藥.通其輕絡.破其血絡中敗血.以此藥主之.

酒漢防已　防風已上各叁分.　炒神麯

獨活已上各伍分.　川芎　柴胡

肉桂　當歸梢　炙甘草
蒼朮已上各壹錢。　羌活壹錢伍分。　桃仁伍箇去皮尖研如泥。

右㕮咀。都作一服。好酒三大盞煎至一大盞去柤。稍熱食遠服。

獨活湯

治因勞役腰痛如折。沉重如山。

炙甘草貳錢。　羌活
獨活　大黃煨。
肉桂叁錢已上各　當歸梢
酒漢防己　酒黃檗壹兩已上各

右㕮咀。每服五錢。酒半盞。水一大盞半煎至一盞去柤。熱服。

破血散疼湯

治乘馬損傷。跌其脊骨。惡血流於脇下。其痛苦楚不能轉側。妨於飲食。

羌活　防風　澤瀉
蘇木壹錢伍分。　連翹伍錢。　連翹已上各
柴胡貳錢已上各。　水蛭叁錢炒去煙盡別研。　桃仁叁拾箇。　中桂壹錢已上各
當歸梢
麝香少許別研。

右件分作二服。每服酒二大盞。水一大盞。除水蛭麝香另研如泥。煎餘藥作一大盞。去柤。上火令稍熱。調二味空心服之。兩服立愈。

地龍散

治腰脊痛。或打撲損傷。從高墜下。惡血在太陽經中。令人腰脊痛。或脛膕臂股中痛不可忍。鼻塞不通。

當歸梢壹分。　麻黃伍分。　黃檗　桃仁陸箇。　中桂　蘇木陸分。　甘草壹已上各錢。　地龍肆已上各分。　獨活　羌活貳錢。

右咬咀。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去柤。溫服。食遠。

蒼朮湯

治濕熱腰腿疼痛。

防風能勝濕。　柴胡貳錢。行經。　黃檗已上各壹錢。始得之時。寒也。久不愈。寒化爲熱。除濕止痛。　蒼朮參錢。去濕止痛。

右都作一服。水二大盞。煎至一盞。去柤。空心服。

麻黃復煎散

治陰室中汗出。懶語。四肢困倦無力。走注疼痛。乃下焦伏火而不得伸。浮而躁熱汗出。一身盡痛。蓋風濕相搏也。以升陽發汗。漸漸發之。火鬱乃濕在經者。亦宜發汗。況正值季春之月。脈緩而遲。尤宜發汗。令風濕去而陽升。以此困倦乃退。氣血俱得生旺也。

白朮　人參　生地黃
柴胡　防風已上各伍分。　羌活
黃蘗已上各壹錢。　麻黃去節微搗。不令作末。水五大盞煎令沸去沫。煎至二盞。入下項藥再煎。
黃芪已上各貳錢。　甘草叁錢。　杏仁叁箇去皮。

右咬咀。都作一服。入麻黃湯煎至一盞。臨臥服之。勿令食飽。取漸次有汗則効。

緩筋湯一名羌活湯。

治兩目如火。腫痛。兩足及伏兔筋骨痛。膝少力。身重腰痛。夜惡寒。痰嗽。頸項皆急痛。目外眥。目絲急。食不下。

熟地黃壹分。　生甘草　柴胡
紅花　炙甘草　蘇木
獨活已上各貳分。　藁本　升麻
黃芩　草豆蔻仁　酒黃蘗

生地黃　當歸身　麻黃已上各叁分
羌活叁錢　蒼朮伍分
右爲麤末。都作一服。水二大盞。煎至一盞。去粗。食遠服之。

拈痛湯

治濕熱爲病。肩背沉重。肢節疼痛。胸膈不利。
白朮壹錢伍分　人參去芦　苦參酒炒
升麻去芦　葛根　蒼朮已上各貳錢
防風去芦　知母酒洗　澤瀉
黃芩炒　猪苓　當歸身已上各叁錢
炙甘草　黃芩酒洗　茵蔯酒炒
羌活已上各伍錢
右咬咀。每服一兩。水二大盞。煎至一盞。去粗。食遠服。
蒼朮復煎散
治寒濕相合。腦右痛。惡寒。項筋脊骨強。肩背胛眼痛。膝臏痛無力。行步沉重。
紅花壹分　黃蘗叁分　柴胡

蘘本　澤瀉　白朮
升麻已上各伍分　羌活壹錢　蒼朮肆兩水二椀煎二盞去粗入藥

右咬咀先煎蒼朮湯二大盞復煎前項藥至一大盞稍熱空心服取微汗爲効忌酒濕麵

羌活蒼朮湯
治脚膝無力沉重

炙甘草　黃蘗
生甘草　葛根已上各伍分
柴胡柒分半　升麻
縮砂仁　蒼朮已上各壹錢
黃芪貳錢　知母貳錢伍分

草豆蔻
橘皮陸分
獨活
防風壹錢伍分
羌活叁錢

右咬咀分作二服水二大盞煎至一盞去粗空心服

婦人們

經閉不行有三論

陰陽別論云二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳爲風消爲息賁者死不治婦人脾胃久虛或形羸氣血俱衰而致經水斷絕不行或病中消胃熱善食漸瘦津液不生夫經者血脈津液所化津液既

絕。爲熱所燥。肌肉消瘦。時見渴燥。血海枯竭。病名曰血枯經絕。宜瀉胃之燥熱。補益氣血。經自行矣。此證或經適行而有子。子不安爲胎病者有矣。或心包脈洪數。躁作時見大便祕澀。小便雖清不利。而經水閉絕不行。此乃血海乾枯。宜調血脈。除包絡中火邪。而經自行矣。內經所謂小腸移熱於大腸。爲癰瘕。爲沉脈澀不利。則月事沉滯而不利。故云爲癰瘕爲沉也。或因勞心。心火上行。月事不來。安心和血瀉火。經自行矣。故內經云。月事不來者。胞脈閉也。胞脈者。屬心而絡於胞中。令氣上迫肺心。氣不得下。故月事不來也。

經漏不止有三論

陰陽別論云。陰虛陽搏謂之崩。婦人脾胃虛損。致命門脈沉細而數疾。或沉弦而洪大有力。寸關脈亦然。皆由脾胃有虧。下陷於腎。與相火相合。濕熱下迫。經漏不止。其色紫黑。如夏月腐肉之臭。中有白帶者。脈必弦細。寒作於中。中有赤帶者。其脈洪數疾熱明矣。必腰痛或臍下痛。臨經欲行。先見寒熱往來。兩脅急縮。兼脾胃證出見。或四肢困熱。心煩不得眠臥。心下急。宜大補脾胃而升舉血氣。可一服而愈。或人故貴脫勢。人事疎少。或先富後貧。心氣不足。其火大熾。旺於血脈之中。又致脾胃飲食失節。火乘其中。形質肌肉容顏似不病者。此心病者不行於診。故脾胃飲食不調。其證顯矣。而經水不時而下。或適來適斷。暴下不止。治當先說惡死之言勸諭。令拒死而心不動。以大補氣血之藥。舉養脾胃。微加鎮墜心火之藥。治其心。補陰瀉陽。經自止矣。痿論云。悲哀大甚。則胞絡絕也。陽氣內動發。則心下崩數溲血也。故本病曰。大經

空虛。發則肌痺。傳爲脈痿。此之謂也。

升陽除濕湯一名調經升麻除濕湯。

治女子漏下惡血。月事不調。或暴崩不止。多下水漿之物。皆由飲食不節。或勞傷形體。或素有心氣不足。困飲食勞倦。致令心火乘脾。其人必怠惰嗜臥。四肢不收。困倦乏力。無氣以動。氣短。上氣逆急上衝。其脈緩而弦急。按之洪大。皆中之下得之。脾土受邪也。脾主滋榮周身者也。心主血。血主脈。二者受邪。病皆在脈。脈者血之府也。脈者人之神也。心不主令包絡代之。故曰心之脈主屬心系。心系者。包絡命門之脈也。主月事。因脾胃虛而心包乘之。故漏下月事不調也。況脾胃爲血氣陰陽之根蒂也。當除濕去熱。益風氣上伸以勝其濕。又云。火鬱則發之。

當歸酒洗。　獨活已上各伍分。　蔓荊子柒分。

防風　炙甘草　升麻

葉本已上各壹錢。　柴胡　羌活

蒼朮　黃芪已上各壹錢伍分。

右剉如麻豆大。勿令作末。都作一服。以潔淨新汲水三大盞。煎至一大盞。去粗。空心熱服。待少時以早飯壓之。可一服而已。如灸足太陰脾經中血海穴二七壯亦已。

此藥乃從權之法。用風勝濕。爲胃下陷而氣迫於下。以救其血之暴崩也。併血惡之物住後。必須黃芪、

人參炙甘草當歸之類數服以補之。於補氣升陽湯中加以和血藥便是也。若經血惡物下之不絕。尤宜究其根源。治其本經。只益脾胃。退心火之亢。乃治其根蒂也。若遇夏月白帶下脫漏不止。宜用此湯。一服立止。

涼血地黃湯

治婦人血崩。是腎水陰虛。不能鎮守包絡相火。故血走而崩也。

黃芩　荊芥穗　蔓荊子已上各壹分。
黃蘗　知母　葉本
細辛　川芎已上各貳分。　黃連
羌活　柴胡　升麻
防風已上各叁分。　生地黃　當歸已上各伍分。
甘草壹錢。　紅花少許。

右㕮咀都作一服。水三大盞。煎至一盞。去柤。稍熱。空心服之。

足太陰脾之經中血海二穴。在膝臏上內廉白肉際二寸中。治女子漏下惡血。月事不調。逆氣腹脹。其脈緩者是也。灸三壯。

足少陰腎之經中陰谷二穴。在膝內輔骨後大筋下小筋上。按之應手。屈膝取之。治膝如錐。不得屈伸。舌

縱涎下。煩逆溺難。少腹急引陰痛。股內臙痛。婦人漏血不止。腹脹滿不得息。小便黃如蠱。女子如妊身。可灸二壯。

酒煮當歸丸

治癩疝白帶下疰。腳氣。腰已下如在冰雪中。以火焙炕。重重厚綿衣蓋其上。猶寒冷不任。寒之極也。面白如枯魚之象。肌肉如刀割削。瘦峻之速也。小便不止。與白帶長流而不禁。固自不知覺。面白目青藍如菜色。目眩眩無所見。身重如山。行步欹側。不能安地。腿膝枯細。大便難。祕口不能言。無力之極。食不下。心下痞。煩心懊憹不任其苦。面停垢。背惡寒。小使遺而不知。此上中下三陽眞氣俱虛。欲竭噦嘔不止。胃虛之極也。脈沉厥緊而澀。按之空虛。若脈洪大而濇。按之無力。猶爲中寒之證。況按之空虛者乎。

當歸壹兩。　茴香伍錢。　黑附子炮製去皮臍。　良薑已上各柒錢。

右四味剉如蒜豆大。以上等好酒一升半同煮。至酒盡焙乾。

炙甘草　苦練生用。　丁香已上各伍錢。

木香　升麻已上各壹錢。　柴胡貳錢。

炒黃鹽　全蠍已上各叁錢。　延胡索肆錢。

右與前四味藥同爲細末。酒煮麵糊爲丸。如梧桐子大。每服五七十丸。空心淡醋湯下。忌油膩冷物酒濕麵。

固眞丸

治白帶久下不止。臍腹冷痛。陰中亦然。目中溜火。視物眩眩然無所見。齒皆惡熱飲痛。須得黃連細末擦之乃止。惟喜乾食。大惡湯飲。此病皆寒濕乘其胞內。故喜乾而惡濕。肝經陰火上溢。走於標。故上壅而目中溜火。腎水侵肝而上溢。致目眩眩而無所見。齒惡熱飲者。是陽明經中伏火也。治法當大瀉寒濕。以丸藥治之。故曰寒在下焦。治宜緩。大忌湯散。以酒製白石脂白龍骨以枯其濕。炮乾薑大熱辛瀉寒水。以黃蘗之大寒爲因用又爲鄉導。故云古者雖有重罪。不絕人之後。又爲之伏其所主。先其所因之意。又瀉齒中惡熱飲也。以柴胡爲本經之使。以芍藥五分導之。恐辛熱之藥大甚。損其肝經。故微瀉之。以當歸身之辛溫。大和其血脈。此用藥之法備矣。

黃蘗酒洗。　白芍藥已上各伍分。　柴胡　當歸酒洗已上各貳錢。

白石脂已上各壹錢。火燒赤。水飛細研。日乾。　白龍骨酒煮。日乾。水飛爲末。

乾薑津錢炮。

右件除龍骨白石脂水飛研外。同爲細末。水煮麵糊爲丸。如雞頭仁大。日乾。空心多用白沸湯下。無令胃中停滯。待少時以早飯壓之。是不令熱藥犯胃。忌生冷硬物酒濕麵。

烏藥湯

治婦人血海疼痛。

當歸　甘草　木香已上各伍錢。

烏藥壹兩。　香附子貳兩炒。

右㕮咀。每服五錢。水二大盞。去柤。溫服。食前。

助陽湯一名升陽燥濕湯。

治白帶下。陰戶中痛。空心而急痛。身黃皮緩。身重如山。陰中如冰。

生黃芩　橘皮已上各伍分。　防風

高良薑　乾薑　郁李仁

甘草已上各壹錢。　柴胡叁分。　白葵花染叁。

右剉如麻豆大。分作二服。每服水二大盞。煎至一盞。去柤。食前。稍熱服。

水府丹

治婦人久虛積冷。經候不行。癥瘕癖塊。腹中暴痛。面有黯黯。黎黑羸瘠。

硇砂炙過沸湯淋熬取。　紅豆已上各伍錢。　桂心另爲末。

木香　乾薑已上各壹兩。　砂仁貳兩。

經煅花蘂石（研壹伍錢）兩　班猫（壹百箇去頭翅）　生地黃汁

童子小便（各壹升）　臘月狗膸（柒枚）　芫蜻（叁百箇去頭足糯米壹叁升炒米黃去米不用）

右九味爲細末同三汁熬爲膏和丸如雞頭大硃砂爲衣每服一丸温酒細嚼食前服米飲亦可孕婦不可服

丁香膠艾湯

治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲食不節所得經隔少時其脈二尺俱弦緊洪按之無力其證自覺臍下如冰求厚衣被以禦其寒白帶白滑之物多間有如屋漏水下時有鮮血右尺脈時微洪也

熟地黃（已上各肆分）　白芍藥（已上各叁分）　川芎

丁香（壹錢）　阿膠（陸分）　生艾葉（壹錢）

當歸（貳分）

右川芎爲細末當歸酒洗剉熟地黃丁香爲細末艾亦剉都作一服水五大盞先煎五味作一盞零二分去粗入膠再上火煎至一大盞帶熱空心服之

黃芪當歸人參湯

丁未仲冬郭大方來說其妻經水暴崩不止先曾損身失血自後一次縮一十日而來今次不止其人心窄性急多驚以予料之必因心氣不足飲食不節得之大方曰無到彼診得掌中寒脈沉細而緩間

而沉數。九竅微有不利。四肢無力。上喘氣短促。口鼻氣皆不調。果有心氣不足脾胃虛弱之證。胃脘當心而痛。左脅下縮急有積。當臍有動氣。腹中鳴。下氣大便難。虛證極多。不能盡錄。擬先治其本。餘證可以皆去。安心定志鎮墜其經。調和脾胃。大益元氣。補其血脈。令養其神。以大熱之劑去其冬寒。凝在皮膚內。少加生地黃。去命門相火。不令四肢痿弱。

黃連壹分。　生地黃叁分。　連神麴
橘皮　桂枝已上各伍分。　草豆蔻仁陸分。
黃芪　人參　麻黃不去節已上各壹錢。
當歸身壹錢伍分。　杏仁伍箇另研如泥。

右咬咀作二服。水二大盞半。煎麻黃令沸去沫。煎至二盞。入諸藥同煎至一大盞。於巳午之間。食消盡服之。一服立止。其胃脘痛乃胃上有客寒。與大熱藥草豆蔻丸一十五丸。白湯送下。其痛立止。再與肝之積藥除其積之根源而愈。

當歸芍藥湯

治婦人經脈漏下不止。其色鮮紅。時值七月處暑之間。先因勞役。脾胃虛弱。氣短氣逆。自汗不止。身熱悶亂。惡見飲食。非惟不入。亦不思食。沉懶困倦。四肢無力。大便時泄。後再因心氣不足。經脈再下不止。惟覺氣下脫。其元氣逆上全無。惟覺心腹中氣下行。氣短少不能言。是無力以言。非懶語也。此藥主之。

柴胡貳分　炙甘草　生地黃已上各叁分
橘皮不去白　熟地黃已上各伍分　黃芪壹錢伍分
蒼朮泔浸去皮　當歸身　白芍藥
白朮已上各貳錢

右十味咬咀如麻豆大分作二服水二盞半煎至一盞去柤稍熱空心服之

柴胡調經湯

治經水不止鮮紅項筋急腦痛脊骨強痛

炙甘草　當歸身　葛根已上各叁分
獨活　藁本　升麻已上各伍分
柴胡柒分　羌活　蒼朮已上各壹錢
紅花少許

右剉如麻豆大都作一服水四大盞煎至一盞去柤空心稍熱服取微汗立止

一婦人經候凝結黑血成塊左廂有血瘕水泄不止穀有時不化後血塊暴下幷水俱作是前後二陰有形血脫竭於下既久經候猶不調水泄日見三兩行食罷煩心飲食減少甚至瘦弱東垣老人曰夫聖人治病必本四時升降浮沉之理權變之宜必先歲氣無伐天和無勝無虛遺人夭殃無致邪無失正絕人

長命。故仲景云。陽盛陰虛。下之則愈。汗之則死。陰盛陽虛。汗之卽愈。下之卽死。大抵聖人立法。且如升陽或發散之劑。是助春夏之陽氣。令其上升。乃瀉秋冬收藏殞殺寒凉之氣。此病是也。當用此法治之。升降浮沉之至理也。天地之氣。以升降浮沉乃從四時。如治病不可逆之。故經云。順天則昌。逆天則亡。可不畏哉。夫人之身。亦有四時天地之氣。不可止認在外。人亦體同天地也。今經漏不止。是前陰之氣血已脫下矣。水泄又數年。是後陰之氣血下陷以脫矣。後陰者。主有形之物也。前陰者。精氣之戶下竭。是病人周身之血氣。常行秋冬之令。陰主殺。此等收藏之病是也。陽生陰長。春夏是也。在人之身。令氣升浮者。穀氣上行是也。既病人周身血氣皆不生長。穀氣又不勝。其肌肉消少。是兩儀之氣俱將絕矣。既下元二陰俱脫。血氣將竭。假令當是熱證。今下焦久脫。化爲寒矣。此病久沉久降。寒濕大勝。當急救之。瀉寒以熱。除濕以燥。大升大舉。以助生長。補養氣血。不致偏竭。聖人立治之法。既濕氣大勝。以所勝治之。助甲風木上升是也。故經云。風勝濕。是以所勝平之也。當先調和胃氣。次用白朮之類。以燥其濕而滋元氣。如其不止。後用風藥以勝濕。此便是大舉大升。以助春夏二濕之久陷下之至治也。

益胃升陽湯

血脫益氣。古聖人之法也。先補胃氣。以助生發之氣。故曰陽生陰長。諸甘藥爲之先務。舉世皆以爲補。殊不知甘能生血。此陽生陰長之理也。故先理胃氣。人之身內胃氣爲寶。

柴胡　升麻已上各伍分。　炙甘草

當歸身酒洗。炒神麯已上各錢伍分。生黃芩少許。

右咬咀。每服二錢。水二大盞。煎至一盞。去柤稍熱服。

如腹中痛。每服加白芍藥叁分。中桂少許。

如渴或口乾。加葛根貳分。不拘時候。

升陽陰經湯

治經水不止。如右尺脈按之空虛。是氣血俱脫。大寒之證。經手其脈數疾。舉指弦緊或澀。皆陽脫之證。陰火亦亡。見熱證於口鼻眼。或渴。此皆陰躁陽欲先去也。當温之舉之升之浮之燥之。此法當大升浮血氣。切補命門之下脫也。

陳皮已上各壹錢。黃芪貳錢。人參去芦。有嗽去之。白朮叁錢。

肉桂去皮。盛夏勿用。秋冬用。白芍藥 紅花已上各伍分。

細辛陸分。人參去芦。 熟地黃炮製。去腐。

川芎已上各壹錢。獨活根 黑附子皮臍。

炙甘草錢已上各伍分。羌活 藁本去土。

防風已上各貳錢。白朮 當歸

黃芪叁錢。已上各　柴胡叁錢。已上各　桃仁拾箇湯浸去皮尖細研。

右㕮咀。每服三錢。若病勢順當漸加至五錢。每服水三盞。煎至一盞。空心熱服。

半產誤用寒凉之藥論

婦人分免及半產漏下。昏冒不省。瞑目無所知覺。蓋因血暴亡。有形血去則心神無所養。心與包絡者君火相火也。得血則安。亡血則危。火上熾。故令人昏冒。火勝其肺。瞑目不省人事。是陰血暴去不能鎮撫也。血已虧損。往往用滑石、甘草、石膏之類。乃辛甘大寒之藥。能瀉氣中之熱。是血虧瀉氣。乃陰虧瀉陽。使二者俱傷。反爲不足。虛勞之病。昏迷不省者。上焦心肺之熱也。此無形之熱。用寒凉之藥驅令下行。豈不知上焦之病。悉屬於表。乃陰證也。汗之則愈。今反下之。幸而不死。暴虧氣血。生命豈能久活。又不知內經有說。病氣不足。宜補不宜瀉。俱瞑目之病。悉屬於陰。宜汗不宜下。又不知傷寒鬱冒。得汗則愈。是禁用寒凉藥也。分免半產。本氣不病。是暴去其血。亡血補血。又何疑焉。補其血則神昌。常時血下降亡。今當補而升舉之。心得血而養。神不昏矣。血若暴下。是秋冬之令大旺。今舉而升之。以助其陽。則月張神不昏迷矣。今立一方。補血養血。生血益陽。以補手足厥陰之不足也。

全生活血湯

紅花叁分。　蔓荊子　細辛已上各伍分。

生地黃夏月多加之。　熟地黃已上各壹錢。

藁本

川芎已上各壹錢伍分.　羌活　防風諸陽既陷.何以知之.血下脫故也.
獨活　柴胡去苗.　炙甘草
當歸身酒洗.　白芍藥　葛根已上各貳錢.
升麻已上各叁錢.

右㕮咀.每服五錢.水二盞.煎至一盞.去柤.食前稍熱服.

當歸附子湯
治臍下冷痛.赤白帶下.

當歸貳分.　炒鹽叁分.
升麻已上各伍分.　甘草陸分.
黃蘗少許爲引用.　附子壹錢.

右爲麤末.每服五錢.水五盞.煎至一盞.去柤.稍熱服.或爲細末.酒麵糊爲丸亦可.

調經補眞湯
冬後一月.微有地泥冰泮.其白帶再來.陰戶中寒.一服立止.

獨活　乾薑炮.　蘗本
防風　蒼朮已上各貳分.　柴胡柒分.　麻黃不去節.
乾薑良薑各貳錢.

炙甘草　人參去芦　當歸身
白朮　生黃芩　升麻已上各伍分
黃芪柒分　良薑　澤瀉
羌活已上各壹錢　柴胡肆錢　杏仁貳箇
桂枝少許　白葵花柒朵去蕚

右咬咀除黃芩麻黃各另外都作一服先以水三大盞半煎麻黃一味令沸掠去沫入餘藥同煎至一盞零柒分再入生黃芩煎至一盞空心服之候一時許可食早飯

坐藥龍鹽膏

茴香叁分　枯礬伍分　良薑
當歸梢　酒防己　木通已上各壹錢
丁香　木香　川烏炮已上各壹錢伍分
龍骨　炒鹽　紅豆
肉桂已上各貳錢　厚朴叁錢　延胡索伍錢
全蠍伍箇

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大綿裹留系在外內丸藥陰戶內日易之

勝陰丹

爲水藥力小再取三錢內加行性熱藥項下

柴胡　甘松　大椒　破故紙煮焙乾秤同蒜分

右爲細末依前法用

迴陽丹

羌活　甘松已上各貳分　大椒　枯礬已上各伍分爲必用之藥臨去之則不効　蝎蟲二箇去翅足炒　全蠍　草烏頭　三柰子　柴胡　破故紙　升麻根　水蛭炒已上各叁分　蓽撥　川烏已上各柒分　蒜已上各壹錢　羌活升麻貳分已上各　三柰子伍分已上各　全蠍叁箇　枯白礬　川烏頭　蒜柒分　麝香少許

右爲極細末依前製用臍下覺暖爲効

柴胡丁香湯

治婦人年三十歲臨經先腰臍痛。甚則腹中亦痛。經縮三兩日。

生地黃貳分。　丁香肆分。　當歸身

防風　羌活已上各壹錢。　柴胡壹錢伍分。

全蠍壹箇。

右件都作一服。水二盞。煎至一盞。去粗。食前稍熱服。

延胡苦煉湯

治臍下冷撮痛。陰冷大寒白帶下。

黃檗壹分。爲引用。　延胡索　苦練子已上各貳分。

附子炮。　肉桂已上各叁分。　炙甘草伍分。

熟地黃壹錢。　肉桂壹錢。

右都作一服。水二大盞。煎至一盞。食前服。

桂附湯

治白帶腥臭。多悲不樂。大寒。

黃檗爲引用。　知母已上各伍分。

附子叁錢。

右咬咀。都作一服。水二盞。煎至一盞。去柤。食遠熱服。

如少食常飽。有時似腹脹夯悶。加白芍藥伍分。

如不思飲食。加五味子貳拾箇。

如煩惱面上如蟲行。乃胃中元氣極虛。加黃芪壹錢伍分。人參柒分。炙甘草升麻伍分。已上各

人參補氣湯

治四肢懶倦。自汗無力。

丁香末貳分。

生地黃

人參

黃蘗

升麻已上各柒分。

全蠍壹箇。

生甘草梢

白芍藥已上各伍分。

防風

知母

柴胡壹錢。

五味子貳拾箇。

炙甘草已上各叁分。

熟地黃陸分。

羌活

當歸身

黃芪壹錢伍分。

右剉如麻豆大。都作一服。水二盞。煎至一盞。去柤。空心稍熱服。

黃芪白朮湯

治婦人四肢沉重。自汗。上至頭際頸而還。惡風。頭痛躁熱。

細辛叁分。　吳茱萸　川芎已上各伍分。

柴胡　升麻已上各壹錢。　當歸身壹錢伍分。

黃蘗酒洗。　炙甘草　羌活已上各貳錢。

五味子叁錢。　白朮　人參已上各伍錢。

黃芪壹兩。

右咬咀。每服五錢。水二大盞。生薑五片。煎至一盞。去粗。食前熱服。

如腹中痛不決。加炙甘草壹錢。汗出不止。加黃蘗壹錢。

白朮茯苓湯

治胃氣弱。身重有痰。惡心欲吐。是風邪羈絆於脾胃之間。當先實其脾胃。

白朮　白茯苓　半夏已上各壹兩。

炒麴貳錢。　麥蘗麵伍分。炒。

右咬咀。每服五錢。水二大盞。入生薑五片。煎至一盞。去粗。不拘時服。

增味四物湯

治婦人血積。

當歸　川芎　芍藥
熟地黃　京三稜　乾漆炒燥
肉桂去皮。　廣茂已上各等分。

右爲麤末。每服五錢。水二大盞。煎至一盞。去柤。食前稍熱服。

補經固眞湯

白文舉正室白帶常漏久矣。諸藥不効。診得心包尺脈微。其白帶下流不止。叔和云。崩中日久爲白帶。漏下時多。白滑血枯。崩中者。始病血崩。久則血少。復亡其陽。故白滑之物。下流不止。是本經血海將枯。津液復亡。枯乾不能滋養筋骨。以本部行經藥爲引用爲使。以大辛甘油膩之藥潤其枯燥而滋益津液。以大辛熱之氣味藥補其陽道。生其血脈。以苦寒之藥泄其肺而救上熱傷氣。以人參補之。以微苦溫之藥爲佐而益元氣。

白葵花去萼研爛肆分。　甘草炙。　郁李仁去皮尖研泥。
柴胡已上各壹錢。　乾薑細末。　人參已上各貳錢。
生黃芩壹錢細研。　陳皮留白五分。

右件除黃芩外。以水三盞。煎至一盞七分。再入黃芩同煎至一盞。去柤。空心熱服。少時以早飯壓之。

溫衛補血湯

治耳鳴。鼻不聞香臭。口不知穀味。氣不快。四肢困倦。行步欹側。髮脫落。食不下。膝冷陰汗帶下。喉中吟吟不得臥。口舌益乾。大息頭不可以回顧。項筋緊。脊強痛。頭旋眼黑。頭痛欠噫。

生地黃　白朮　藿香
黃蘗已上各壹分。　牡丹皮　蒼朮
王瓜根　橘皮　吳茱萸已上各貳分。
當歸身貳分半。　柴胡　人參
熟甘草　地骨皮已上各叁分。　升麻肆分。
生甘草伍分。　黃芪壹錢貳分。　丁香壹箇。
桃仁叁箇。　葵花柒朵。

右咬咀作一服。用水二大盞。煎至一盞。去柤。食前熱服。

立効散

治婦人血崩不止。

當歸　蓮花心　白綿子
紅花　茅花已上各壹兩。

右剉如豆大。白紙裹定泥固。炭火燒灰存性爲細末。

如乾血氣。研血竭爲引。好温酒調服。加輕粉。壹錢。

如血崩不止。加麝香爲引。好温酒調服。

四聖散

治婦人赤白帶下。

川烏炮製。　生白礬已上各壹錢。　紅娘子叁箇。

班猫拾箇。

煉蜜爲丸。如皂子大。綿裹坐之。

温經除濕湯

十月霜冷後。四肢無力。乃痿厥濕熱在下焦也。醋心者。是濁氣不下降。欲爲滿也。合眼麻木作者。陽道不行也。惡風寒者。上焦之分。皮膚中氣不行也。開目不麻者。目開助陽道。故陰寒之氣少退也。頭旋眩運者。風氣下陷於血分。不得伸越而作也。近火則有之。

黄連壹分。　柴胡　草豆蔻

神麯炒。　木香已上各貳分。　麻黄不去節。　黄蘗已上各壹分。

獨活　當歸身　炙甘草

羌活柒分。　升麻伍分。

人參　白朮　猪苓
澤瀉已上各壹錢　黃芪　橘皮
蒼朮已上各貳錢　白芍藥叁錢

右剉如麻豆大分作二服水二盞煎至一盞食遠服治支節沉重疼痛無力之勝藥也

補氣升陽和中湯

李正臣夫人病診得六脈俱中得弦洪緩相合按之無力弦在上是風熱下陷入陰中陽道不行其證閉目則渾身麻木晝減而夜甚覺而開目則麻木漸退久則絕止常開其目此證不作懼其麻木不敢合眼致不得眠身體皆重時有痰嗽覺胸中常似有痰而不利時煩躁氣短促而喘肌膚充盛飲食不減大小便如常惟畏其麻木不敢合眼爲最苦觀其色脈形病相應而不逆內經曰陽盛瞑目而動輕陰病閉目而靜重又云諸脈皆屬於目靈樞經云開目則陽道行陽氣遍布週身閉目則陽道閉而不行如晝夜之分知其陽衰而陰旺也且麻木爲風三尺之童皆以爲然細校之則有區別耳久坐而起亦有麻木爲如繩縛之久釋之覺麻作而不敢動良久則自已以此驗之非有風邪乃氣不行主治之當補其肺中之氣則麻木自去矣如經脈中陰火乘其陽分火動於中爲麻木也當兼去其陰火則愈矣時痰嗽者秋涼在外在上而作也當以温劑實其皮毛身重脈緩者濕氣伏匿而作也時見躁作當升陽助氣益血微瀉陰火與濕通行經脈調其陰陽則已矣非五臟六腑之本有邪也此藥主之

生甘草去腎熱。　酒黃蘗瀉火除濕。　白茯苓除濕導火。
澤瀉除濕導火。　升麻行陽助經。　柴胡已上各壹錢。
蒼朮除濕補中。　草豆蔻仁益陽退外寒。已上各壹錢伍分。　橘皮
當歸身　白朮已上各貳錢。　白芍藥
人參已上各叁錢。　佛耳草　炙甘草已上各肆錢。
黃芪伍錢。

右咬咀。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去粗。食遠服之。

麻黃桂枝升麻湯

治婦人先患渾身麻木。睡覺則少減。開目則已而全愈。又證已痊。又因心中煩惱。遍身骨節疼。身體沉重。飲食減少。腹中氣不運轉。

木香　生薑已上各壹分。　桂枝
半夏　陳皮　草豆蔻仁
厚朴　黑附子　黃蘗已上各貳分。
炙甘草　升麻　白朮
茯苓　澤瀉已上各叁分。　黃芪

麻黃不去節。　人參已上各伍分。

右都作一服。水二盞。煎至一盞。去柤。食遠服之。

蘭室秘藏卷下

大便結燥門

大便結燥論

金匱眞言論云。北方黑色。入通腎。開竅於二陰。藏精於腎。又云。腎主大便。大便難者。取足少陰。夫腎主五液。津液潤則大便如常。若饑飽失節。勞役過度。損傷胃氣。及食辛熱味厚之物。而助火邪。伏於血中。耗散眞陰。津液虧少。故大便結燥。然結燥之病不一。有熱燥。有風燥。有陽結。有陰結。又有年老氣虛。津液不足而結燥者。治法云。腎惡燥。急食辛以潤之。結者散之。如少陰不得大便。以辛潤之。太陰不得大便。以苦泄之。陽結者散之。陰結者温之。仲景云。小便利而大便硬。不可攻下。以脾約丸潤之。食傷太陰。腹滿而食不化。腹鬱然不能大便者。以苦藥泄之。如血燥而不能大便者。以桃仁酒製大黄通之。風結燥而大便不行者。以麻子仁加大黄利之。如氣澁而大便不通者。以郁李仁枳實皂角仁潤之。大抵治病必究其源。不可一概用巴豆牽牛之類下之。損其津液。燥結愈甚。復下復結。極則以至導引於下而不通。遂成不救。噫。可不愼哉。

通幽湯

治大便難。幽門不通。上衝吸門不開。噎塞不便。燥祕氣不得下。治在幽門以辛潤之。

炙甘草　已上各
熟地黃伍分　已上各
當歸身壹錢　已上各
紅花壹分　已上各
升麻
生地黃
桃仁泥

右都作一服。水二大盞。煎至一盞。去柤。調檳榔細末五分。稍熱。食前服之。

潤燥湯

升麻
當歸梢
桃仁泥
生地黃貳錢　已上各
生甘草
麻仁壹錢　已上各
熟地黃
大黃煨。
紅花伍分。

右除桃仁麻仁另研如泥外。剉如麻豆大。都作一服。水二盞。入桃仁麻仁泥。煎至一盞。去柤。空心稍熱服。

潤腸丸

治脾胃中伏火。大便祕澁。或乾燥閉塞不通。全不思食。及風結血祕。皆令閉塞也。以潤燥和血疎風。自然通利矣。

桃仁湯浸。去皮尖。
大黃煨。
麻仁壹兩　已上各
羌活壹錢　已上各
當歸梢

右除桃仁麻仁另研如泥外。搗爲極細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三五十丸。空心白湯下。

如病人不大便。爲大便不通而澀。其邪盛者。急加酒洗大黃以利之。

如血燥而大便燥乾者。加桃仁、酒洗大黃。

如風結燥。大便不行者。加麻仁、大黃。

如風濕而大便不行。加煨皂角仁、大黃、秦艽以利之。

如脈澀覺身有氣澀而大便不通者。加郁李仁、大黃以除氣燥。

如寒陰之病。爲寒結閉而大便不通者。以局方中半硫丸或加煎附子乾薑湯冰冷與之。其病雖陰寒之證。當服陽藥補之。若大便不通者。亦當十服中與一服藥微通其大便。不令結閉。乃治之大法。

若病人雖是陰證。或是陰寒之證。其病顯躁。脈實堅。亦宜於陽藥中少加苦寒之藥以去熱躁。躁止勿加。

如陰躁欲坐井中者。其二腎脈按之必虛。或沉細而遲。此易爲辯耳。如有客邪之病。亦當從權加藥以去之。

麻黃白朮湯

治大便不通。五日一遍。小便黃赤。渾身腫。面上及腹尤甚。色黃麻木。身重如山。沉困無力。四肢痿輭。不能舉動。喘促唾清水。吐噦痰唾白沫如膠。時躁熱。發欲去衣。須臾而過。振寒。項額有時如冰。額寒尤甚。頭旋眼黑。目中溜火。冷淚。鼻不聞香臭。少腹急痛。當臍有動氣。按之堅硬而痛。

青皮去腐。　酒黃連壹已上各分。　酒黃檗
橘紅　甘草炙半。　升麻已上各貳分。
黃芪　人參　桂枝
白朮　厚朴　柴胡
蒼朮　猪苓叁已上各分。　吳茱萸
白伏苓　澤瀉肆已上各分。　白豆蔻
炒麴已上各伍分。　麻黃不去伍錢。節。　杏仁肆箇。

右�once咀分作二服。水二大盞半。先煎麻黃令沸去沫。再入諸藥。同煎至一盞。去粗稍熱。食遠服。此證宿有風濕熱伏於榮血之中。其木火乘於陽道。爲上盛元氣短少。上喘爲陰火傷其氣。四肢痿。在腎水之間。乃所勝之病。今正遇冬寒得時。乘其肝木。又實其母肺金。尅火凌木。是大勝必有大復。其證善恐欠多噓。鼻中如有物。不聞香臭。目視眈眈多悲健忘。少腹急痛。通身黃。腹大脹。面目腫尤甚。食不下。痰唾涕有血。目眥瘍。大便不通。並宜此藥治之。

升陽湯一名升陽瀉濕湯。

治膈咽不通。逆氣裏急。大便不行。

青皮　槐子已上各貳分。　生地黃

熟地黃　黃蘗已上各叁分　當歸身
甘草梢已上各肆分　蒼朮伍分　升麻柒分
黃芪壹錢　桃仁拾箇另研

右咬咀如麻豆大都作一服入桃仁泥水二大盞煎至一盞去柤稍熱食前服

活血潤燥丸

治大便風祕血祕常常燥結

當歸梢壹錢　防風叁錢　大黃濕紙裹煨
羌活已上各壹兩　皂角仁燒存性去皮壹兩伍錢其性得濕則滑濕滑則燥結自除
桃仁如泥貳兩研　麻仁研如泥貳兩伍錢

右除麻仁桃仁另研如泥外爲極細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十丸白湯下三兩服後須以蘇麻子粥每日早晚食之大便日久不能結燥也以磁器盛之紙封無令見風

潤腸湯

治大腸結燥不通

生地黃　生甘草已上各壹錢　大黃煨
熟地黃　當歸梢　升麻

桃仁　麻仁已上各壹錢　紅花叁分

右㕮咀。水二盞。煎至一盞。去粗。食遠温服。

小便淋閉門

小便淋閉論

難經云。病有關有格。關則不得小便。又云。關無出之謂。皆邪熱爲病也。分在氣在血而治之。以渴與不渴而辨之。如渴而小便不利者。是熱在上焦肺之分。故渴而小便不利也。夫小便者。是足太陽膀胱經所主也。長生於申。申者西方金也。肺合生水。若肺中有熱。不能生水。是絶其水之源。經云。虛則補其母。宜清肺而滋其化源也。故當從肺之分。助其秋令。水自生焉。又如雨如露如霜。皆從天而降下也。乃陽中之陰。明秋氣自天而降下也。且藥有氣之薄者。乃陽中之陰。是感秋清肅殺之氣而生。可以補肺之不足。淡味滲泄之藥是也。茯苓、澤瀉、琥珀、燈心、通草、車前子、木通、瞿麥、扁蓄之類。以清肺之氣。泄其火。資水之上源也。如不渴而小便不通者。熱在下焦血分。故不渴而大燥。小便不通也。熱閉於下焦者。腎也。膀胱也。乃陰中之陰。陰受熱邪。閉塞其流。易上老云。寒在胸中。渴絶不入。熱在下焦。填塞不便。須用感北方寒水之化氣味俱陰之藥。以除其熱。泄其閉塞。內經云。無陽則陰無以生。無陰則陽無以化。若服淡滲之藥。其性乃陽中之陰。非純陽之劑。陽無以化。何能補重陰之不足也。須用感地之水運而生太苦之味。感天之寒藥而生大寒之氣。此氣味俱陰。乃陰中之陰也。大寒之氣。入稟之生膀胱。寒水之運。入感之生腎。此藥能補腎

與膀胱受陽中之陽熱火之邪而閉其下焦使小便不通也夫用大苦寒之藥治法當寒因熱用又云必伏其所主而先其所因其始則氣同其終則氣異也

通關丸一名滋腎丸

治不渴而小便閉熱在下焦血分也

黃檗去皮酒洗焙剉 知母剉酒洗焙乾已上各壹兩 肉桂伍分

右爲細末熟水爲丸如梧桐子大每服一百丸空心白湯下頓兩足令藥易下行故也如小便利前陰中如刀刺痛當有惡物下爲驗

清肺飲子

治渴而小便閉澀不利邪熱在上焦氣分

燈心壹分 通草貳分 澤瀉

瞿麥 琥珀已上各伍分 扁蓄

木通已上各㕮分 車前子炒壹錢 茯苓去皮貳錢

猪苓去皮叁錢

右爲麤末每服五錢水一盞半煎至一盞稍熱食遠服或局方八正散五苓散亦宜服之

導氣除燥湯

治小便閉塞不通。乃血澀至氣不通而竅澀也。

茯苓去皮。　滑石炒黃。已上各貳錢。　知母細剉。

澤瀉已上各叁錢。　黃蘗去皮酒洗。肆錢。

右㕮咀。每服五錢。水三盞。煎至一盞。去粗。稍熱。空心服。

如急閉。不拘時服。

腎疸湯

治腎疸目黃。甚至渾身黃。小便赤澀。

羌活。　防風　　蘗本

獨活　　柴胡已上各伍分。　升麻伍錢。

已上治腎疸目黃渾身黃。

白茯苓貳分。　澤瀉叁分。　豬苓肆分。

白朮伍分。　蒼朮壹錢。

已上治小便赤澀。

黃蘗貳分。　人參叁分。　鳥根伍分。

神麴陸分。　甘草叁錢。

右剉如大豆大。分作二服。水三盞。煎至一盞。去柤。稍熱。食前服。

痔漏門

痔漏論

內經曰。因而飽食。筋脈橫解。腸澼爲痔。夫大腸庚也。主津。本性燥。淸肅殺之氣。本位主收。其所司行津以從足陽明。旺則生化萬物者也。足陽明爲中州之土。若陽衰亦殞殺萬物。故曰萬物生於土而歸於土者。是也。以手陽明大腸司其化焉。既在西方本位爲之害。悲司殺之府。因飽食行房。忍泄前陰之氣。歸於大腸。木乘火勢而侮燥金。故火就燥也。大便必閉。其疾甚者。當以苦寒瀉火。以辛溫和血潤燥。疎風止痛。是其治也。以秦艽當歸梢。和血潤燥。以桃仁潤血。以皂角仁除風燥。以地楡破血。以枳實之苦寒補腎。以下泄胃實。以澤瀉之淡滲。使氣歸於前陰。以補淸燥。受胃之濕邪也。白朮之苦甘。以苦補燥氣之不足。其甘味以瀉火而益元氣也。故曰甘寒泄火。乃假枳實之寒也。古人用藥。爲下焦如瀆。又曰。在下者引而竭之。多爲大便祕澀。以大黃推去之。其津血益不足。以當歸和血及油潤之劑。大便自然輭利矣。宜作剉湯以與之。是下焦有熱以急治之之法也。以地楡酸苦而壞胃。故宿食消盡。空心作丸服之。

秦艽白朮丸

治痔疾幷痔漏有膿血。大梗燥硬。而作疼痛不可忍。

秦艽去芦　桃仁湯浸去皮尖　皂角仁燒存性各壹兩

當歸梢酒浸。　澤瀉　枳實麩炒黃。

白朮已上各伍錢。　地榆叁錢。

右爲細末。和桃仁泥研勻。煎熟湯打麵糊爲丸。如雞頭仁大。令藥光滑焙乾。每服五七十丸。白湯下。空心服。待少時以美饍壓之。忌生冷硬物冷水冷菜之類。幷濕麵酒及辣辛熱大料物之類。犯之則藥無驗也。

秦艽蒼朮湯

治痔疾。若破謂之痔漏。大便祕澀。必作大痛。此由風熱乘食飽不通。氣逼大腸而作也。受病者。燥氣也。爲病者。胃濕也。胃刑大腸。則化燥火。以乘燥熱之實。勝風附熱而來。是濕熱風燥四氣而合。故大腸頭成塊者。濕也。作大痛者。風也。若大便燥結者。主病兼受火邪。熱結不通也。去此四者。其西方肺主諸氣。其體收下。亦助病爲邪。須當破氣藥兼之。治法全矣。以剉湯與之。其効如神。

秦艽去苗。　桃仁湯浸去皮另研。　皂角仁燒存性另研。各壹錢。

蒼朮製。　防風已上各柒分。　黃檗去皮酒洗伍分。

當歸梢酒洗。　澤瀉已上各叁分。　梭身檳榔壹分另研。

大黃濕。少許。雖大便過亦不可多用。

右除檳榔桃仁皂角仁三味外。餘藥咬咀如麻豆大。都作一服。水三盞。煎至一盞二分。去粗。入檳榔等

三味末再上火煎至一盞空心熱服待少時以美饘壓之不犯胃氣也服藥日忌生冷硬物及酒濕麵大料物乾薑之類犯之則其藥無効

如有白膿加白麥花頭五朵去萼心青皮半錢不去白入正藥中同煎木香三分爲細末同檳榔等三味依前煎服餌古人治此疾多以歲月除之此藥一服則愈

七聖丸

治大腸疼痛不可忍叔和云積氣生於脾藏傍大腸疼痛陣難當漸交稍瀉三焦火莫謾多方立紀綱

羌活壹兩　郁李仁湯浸去皮另研壹兩伍錢　大黃捌錢煨

檳榔　桂去皮　木香

川芎伍錢　已上各

右除郁李仁另研入外共爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三五十丸白湯下食前取大便微利一服而愈切禁不得多利大便其痛滋甚

秦艽防風湯

治疼漏每日大便時發疼痛如無疼痛者非疼漏也此藥主之

秦艽　防風　當歸身

白芷已上各壹錢伍分　炙甘草　澤瀉已上各陸分

黃蘗伍分　大黃煨　橘皮叁分　已上各
柴胡　升麻貳分　已上各　桃仁叁拾箇
紅花少許

右剉如麻豆大。都作一服。水三盞。煎至一盞。去柤稍熱。空心服之。避風寒。忌房事酒濕麵大辛熱物。

秦艽羌活湯

治痔漏成塊下垂。不任其癢。

羌活壹錢貳分　秦艽　黃芪壹錢　已上各
防風柒分　升麻　炙甘草
麻黃　柴胡伍分　已上各　藁本叁分
細辛少許　紅花少許

右剉如麻豆大。都作一服。水二盞。煎至一盞。去柤。空心服之。忌風寒處大小便。

當歸郁李仁湯

治痔漏。大便硬努出大腸頭下血。苦痛不能忍。

郁李仁　皂角仁壹錢　已上各　枳實柒分
秦艽　麻仁　當歸梢

生地黃　蒼朮已上各伍分　大黃煨

澤瀉已上各叁分

右剉如麻豆大除皂角仁別爲末水三盞煎至一盞去粗入皂角仁末調空心食前服之忌如前

紅花桃仁湯

治痔漏經年因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔治法當補北方瀉中央

黃蘗壹錢伍分　生地黃壹錢　澤瀉捌分

蒼朮陸分　當歸梢　漢防己

防風梢　猪苓已上各伍分　麻黃貳分

紅花半分　桃仁拾箇

右剉如麻豆大水三盞煎至一盞去粗稍熱食前服之忌如前

秦艽當歸湯

治痔漏大便結燥疼痛

大黃煨肆錢　秦艽　枳實已上各壹錢

澤瀉　當歸梢　皂角仁

白朮已上各伍分　紅花少許　桃仁貳拾箇

右都作一服。水三盞。煎至一盞。去柤。食前熱服。忌如前。

陰痿陰汗門

陰痿陰汗及臊臭論

一富者前陰臊臭。又因連日飲酒。腹中不和。求先師治之。曰。夫前陰者。足厥陰肝之脈絡循陰器出其挺末。凡臭者。心之所主。散入五方爲五臭。入肝爲臊。此其一也。當於肝經中瀉行間。是治其本。後於心經中瀉少衝。乃治其標。如惡針當用藥除之。酒者、氣味俱陽。能生裏之濕熱。是風濕熱合於下焦爲邪。故經云。下焦如瀆。又云。在下者引而竭之。酒是濕熱之水。亦宜決前陰以去之。

龍膽瀉肝湯

治陰部時復熱痒及臊臭。

柴胡梢　澤瀉已上各壹錢。　車前子

木通已上各伍分。　生地黃　當歸梢

草龍膽已上各叁分。

右剉如麻豆大。都作一服。水三盞。煎至一盞。去柤。空心稍熱服。便以美膳壓之。此藥柴胡入肝爲引。用澤瀉、車前子、木通淡滲之味利小便。亦除臊氣。是名在下者引而竭之。生地黃、草龍膽之苦寒。瀉酒濕熱。更兼車前子之類。以撤肝中邪氣。肝主血。用當歸以滋肝中血不足也。

清震湯

治小便溺黃臊臭淋瀝。兩丸如冰。陰汗浸多。

羌活　酒黃檗已上各壹錢。　升麻　黃芩已上各伍分。

柴胡　蒼朮　猪苓

澤瀉肆分。　麻黃根　當歸身

防風已上各叁分。　炙甘草

藁本已上各貳分。　紅花壹分。

右剉如麻豆大。都作一服。水二盞。煎至一盞。去粗。臨臥服。大忌酒濕麵。

固眞湯一名正元湯。

治兩丸冷。前陰痿弱。陰汗如水。小便後有餘滴。尻臀幷前陰冷。惡寒而喜熱。膝下亦冷。

升麻　羌活　柴胡已上各壹錢。

炙甘草　草龍膽　澤瀉已上各壹錢伍分。

黃檗　知母已上各貳錢。

右剉如麻豆大。分作二服。水二盞。煎至一盞。去粗。空心稍熱服。以早飯壓之。

清魂湯一名柴胡勝濕湯。

治兩外腎冷。兩髀陰汗。前陰痿。陰囊濕痒臊氣。

柴胡　生甘草　酒黃蘗已上各貳錢。

升麻　澤瀉已上各壹錢伍分。　當歸梢

羌活　麻黃根　漢防己

草龍膽　茯苓已上各壹錢。　紅花少許。

五味子貳拾箇。

右剉如麻豆大。分作二服。水二盞。煎至一盞。去柤。食前稍熱服。忌酒濕麵房事。

椒粉散

治前陰兩丸濕痒痛。秋冬甚。夏月減。

肉桂貳分。　小椒　當歸梢

豬苓已上各叁分。　蛇床子　黑狗脊已上各伍分。

麻黃根壹錢。　輕粉少許。　紅花少許。

班貓兩枚。

右爲末。乾糝上。避風寒冷濕處坐臥。

補肝湯

治前陰冰冷。并陰汗。兩脚痿弱無力。

黃芪柒分。　炙甘草伍分。　升麻
猪苓已上各肆分。　白茯苓　葛根
人參已上各叁分。　柴胡　羌活
陳皮　連翹　當歸身
黃檗炒。　澤瀉　蒼朮
麴末　知母　防風已上各貳分。

右剉如麻豆大。都作一服。水二大盞。煎至一盞。去祖。空心稍熱服。忌酒濕麵。

溫腎湯

治面色痿黃。身黃。脚痿弱無力。陰汗。

柴胡　麻黃根已上各陸分。　白茯苓
白朮　酒黃檗　猪苓
升麻已上各壹錢。　蒼朮　防風已上各壹錢伍分。
澤瀉貳錢。

右分作二服。每服水二大盞。煎至一盞。去祖。食前稍熱服。一時辰許方食。

延胡丁香丸一名丁香疝氣丸。

治臍下撮急疼痛。幷周身皆急痛。小便頻數。及五脈急。獨腎脈按之不急。皆虛無力。名曰腎疝。

羌活叁錢。　當歸　茴香已上各貳錢。
延胡索　麻黃根節　肉桂已上各壹錢。
丁香　木香　甘草蝦拾叁箇。
川烏頭已上各伍分。　防己叁分。

右爲細末。酒煮麵糊爲丸。如雞頭大。每服五十丸。空心鹽白湯服。

瀉痢門

訶子皮散

癸卯冬。白樞判家一老漢。面塵脫色。神氣特弱。病脫肛日久。服藥未驗。復下赤白膿痢。作裏急後重。白多赤少。不任其苦。以求其治。曰。此非肉食膏粱。必多蔬食。或飲食不節。天氣雖寒。衣蓋猶薄。不禁而腸頭脫下者。寒也。眞氣不禁。形質不收。乃血滑脫也。此乃寒滑氣泄不固。故形質下脫也。當以澀去其脫而除其滑。微酸之味固氣上收。以大熱之劑而除寒補陽。以補氣之藥升陽益氣。

御米殼去蒂蜜炒。　橘皮已上各伍分。　乾薑炮。陸分。
訶子柒分。煨去核。

右爲細末。都作一服。水二盞。煎至一盞。和柤空心熱服。

升麻補胃湯

治宿有陽明血證。因五月間大熱喫杏。腸澼下血。喘遠散漫如篩。腰沉沉然。腹中不痛。血色紫黑。病名濕毒腸澼。屬陽明少陽經血證也。

白芍藥壹錢伍分。　升麻　羌活
黃芪已上各壹錢。　生地黃　熟地黃
獨活　牡丹皮　炙甘草
柴胡　防風已上各伍分。　當歸身
葛根已上各叁分。　肉桂少許。

右剉如麻豆大。分作二服。每服水二盞。煎至一盞。去柤。食前稍熱服。

升陽去熱和血湯

治腸澼下血。另作一派。其血喘出有力而遠射。四散如篩。腸中血下行。腹中大作痛。乃陽明氣衝熱毒所作也。當升陽去濕熱。和血脈。是其治也。

橘皮貳分。　熟地黃　當歸身
蒼朮　秦艽　肉桂已上各叁分。

生地黃　牡丹皮
升麻柒分　熟甘草
白芍藥壹錢伍分

右咬咀都作一服。水四盞煎至一盞。去柤。空心稍熱服。立効。

益智和中湯

治腸澼下血。或血色紫黑。腹中痛。腹皮惡寒。右手關脈弦按之無力。而喜熱物熨之。內寒明矣。

肉桂壹分　桂枝肆分
柴胡　葛根
半夏已上各伍分　當歸身
黃芪　升麻已上各壹錢
乾薑少許

右爲麤末。都作一服。水三盞煎至一盞。去柤。食後溫服。

芍藥橐皮丸

治濕熱惡痢血痢頻併窘痛。無問膿血。並皆治之。

芍藥　黃檗已上各壹兩

生甘草伍分　牡丹皮
黃芪已上各壹錢　當歸
白芍藥壹錢伍分　炙甘草

黃連已上各伍錢

右爲末飯爲丸如雞頭大每服五七十丸食前米飲湯下忌油膩酒濕麵等物

和中益胃湯

治太陰陽明腹痛大便常泄若不泄卽祕而難見在後傳作濕熱毒下鮮紅血腹中微痛脅下急縮脈緩而洪弦中之下得之按之空虛

蘇木壹分　葉本　益智仁已上各貳分
熟地黃　炙甘草叁已上各叁分　當歸身肆分
柴胡　升麻已上各伍分

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗空心溫服

槐花散

治腸澼下血濕毒下血

川芎肆分　槐花　青皮
荆芥穗　熟地黃　白朮已上各陸分
當歸身　升麻已上各壹錢

右爲細末每服三錢米飲湯調下食前忌酒濕麵生冷硬物

茯苓湯

治因傷冷飯水泄。一夜走十行。變作白痢。次日其痢赤白。腹中疠痛。減食熱躁。四肢沉困無力。

生黃芩叁分。　當歸身肆分。　肉桂
炙甘草已上各伍分。　猪苓　茯苓已上各陸分。
澤瀉壹錢。　芍藥壹錢伍分。　蒼朮
生薑　升麻　柴胡已上各貳錢。

右咬咀如麻豆大。分作二服。每服水二盞。煎至一盞。去粗稍熱。食前服之。

黃芪補胃湯

治一日大便三四次。溏而不多。有時作泄。腹中鳴。小便黃。

黃芪　柴胡　當歸身
益智　橘皮已上各叁分。　升麻陸分。
炙甘草貳錢。　紅花少許。

右咬咀。都作一服。水二盞。煎至一盞。去粗稍熱。食前服之。

升陽除濕湯

自下而上者。引而去之。

蒼朮壹錢。　柴胡　羌活
防風　升麻　神麴
澤瀉　猪苓已上各伍分。　炙甘草
陳皮　麥蘗麵已上各叁分。
右都作一服。水二盞。煎至一盞。去粗。空心服之。

如胃寒腸鳴。加益智仁半夏。各伍分。生薑三片。棗一枚。同煎。至非腸鳴不得用。

人參益胃湯

治頭悶勞動則微痛。不喜飲食。四肢怠惰。躁熱短氣。口不知味。腹鳴。大便微溏。身體昏悶。覺渴。不喜冷物。

黃芪　甘草　當歸梢
益智已上各貳分。　人參　黃芩
柴胡　半夏　白朮已上各叁分。
陳皮　升麻已上各伍分。　蒼朮壹錢伍分。
紅花少許。
右都作一服。水二盞。煎至一盞。去粗。稍熱。食前服之。

升麻補胃湯

治因內傷服牽牛大黃食藥泄瀉過多腹中大痛。

甘草柒分。　升麻　柴胡

草豆蔻　黃芪已上各伍分。　半夏叁分。

當歸身　乾薑已上各貳分。　紅花少許。

右都作一服。水二盞。煎至一盞。去粗稍熱。食遠服之。

瘡瘍門

散腫潰堅湯

治馬刀瘡結硬如石。或在耳下至缺盆中。或肩上。或於脅下。皆手足少陽經中。及瘰癧遍於頸。或至頰車。堅而不潰。在足陽明經中所出。或二證瘡已破。流膿水。並皆治之。

黃芩（削錢酒洗。炒一半。生用一半。）　草龍膽（酒洗。各炒四遍。）　瓜蔞根（到碎。酒洗。）

黃蘗酒製。　酒知母　桔梗

昆布已上各伍錢。　柴胡肆錢。　炙甘草

京三稜酒洗。　廣茂酒洗炒。　連翹已上各叁錢。

葛根　白芍藥　當歸梢

黃連貳錢已上各　升麻陸分

右咬咀。每服六錢。水二盞。零八分。先浸多半日。煎至一盞。去柤。食後熱服。於臥處伸足在高處。頭低垂。每含一口。作十次嚥。服畢依常安臥。取藥在膈上停蓄故也。另攢半料作細末。煉蜜爲丸。如棊豆大。每服百餘丸。用此藥湯留一口送下。或加海藻五錢炒亦妙。

升陽調經湯

治瘰癧。遶頸。或至頰車。此皆出足陽明胃經中來。若瘡深遠隱曲肉底。是足少陰腎經中來。乃戊脾傳於癸腎。是夫傳與妻。俱作塊子。堅硬大小不等。並皆治之。或作丸亦可。

升麻捌錢　葛根　草龍膽酒製
黃芩酒製　廣茂酒洗炒　京三稜酒洗炒
炙甘草　黃連酒洗　連翹
桔梗已上伍錢各　生黃芩肆錢　當歸梢
芍藥已上叁錢各　黃檗酒洗貳錢　知母酒洗炒壹兩

右另秤一半作末。煉蜜爲丸。如棊豆大。每服百餘丸。一半作咬咀。每服五錢。若能食。大便硬。可旋加至七八錢。水二盞。先浸半日。煎至一盞。去柤。臨臥熱服。足高去枕仰臥。噙一口作十次嚥之。留一口在後送下丸藥服畢。其臥如常。

連翹散堅湯

治耳下或至缺盆或肩上生瘡堅硬如石動之無根名曰馬刀從手足少陽經中來也或生兩脅或已流膿作瘡未破並皆治之

柴胡壹兩貳錢　草龍膽酒洗四次　七瓜根酒製上壹兩

黃芩酒炒次染二錢　當歸梢　生黃芩

廣茂已上各伍錢　京三稜同廣茂酒炒　連翹

芍藥已上各貳錢　炙甘草叁錢　黃連酒炒兩次

蒼朮已上各

右另秤一半爲細末煉蜜爲丸如棊豆大每服百餘丸一半咬咀每服五錢水二盞先浸多半日煎至一盞去相臨臥熱服去枕仰臥每口作十次嚥之留一口送下丸藥服畢臥如常更以後藥塗之

龍泉散　廣茂

龍泉粉炒　瓦粉

京三稜酒洗炒　昆布已上各伍錢

右同爲細末煎熟水調塗之用此藥去疾尤速

救苦化堅湯

治瘰癧。馬刀挾癭。從耳下或耳後下頸至肩上。或入缺盆中。乃手足少陽之經分。其瘰癧在頷下或至頰車。乃足陽明之經分。受心脾之邪而作也。今將二證合而治之。

黃芪壹錢。

護皮毛間腠理虛。及活血脈生血。亦瘡家聖藥也。又能補表實元氣之弱也。

人參叁分。

補肺氣之藥也。如氣短不調及喘者加之。

炙甘草伍分。

能調中和諸藥。瀉火益胃氣。亦能去瘡邪。

升麻壹錢。已上各

葛根伍分。

眞漏蘆

此三味俱足陽明本經藥也。

連翹壹錢。

此一味十二經瘡中之藥。不可無也。能散諸血經氣聚。此瘡家之神藥也。

牡丹皮叁分。

去腸胃中留滯宿血。

當歸身

生地黃

熟地黃已上各叁分。

此三味諸經中和血生血涼血藥也。

白芍藥叁分。

如夏月倍之。其味酸。其氣寒。能補中益肺之虛弱。治腹中痛必用之。冬寒則不可用。

肉桂貳分。

大辛熱。能散結積。陰證瘡瘍須當少用之。此寒因熱用之意。又爲寒陰覆蓋其瘡。用大辛熱以消浮凍之氣。如有煩躁者去之。

柴胡捌分。

功同連翹。如瘡不在少陽經則去之。

黍粘子叁分。

無腫不用。

羌活壹錢。　獨活　防風已上各伍分。

此三味必關手足太陽證。脊痛項強。不可迴視。腰似折。項似拔者。是也。其防風一味辛温。若瘡在膈已上。雖無手足太陽經證。亦當用之。爲能散結去上部風邪。病人身拘急者。風也。

昆布貳分。

其味大鹹。若瘡堅硬結硬者。宜用鹹能軟堅。

京三棱煨貳分　廣茂煨叁分

此二味若癥堅硬甚者用之如不堅硬勿用

益智仁貳分

如唾多者胃不和也或病人吐沫吐食胃上寒者加之無則去之

大麥蘗麵壹錢

治腹中縮急兼能消食補胃

神麴末炒黃色貳分

爲食不消化故也

黃連去鬚叁分

以治煩悶

黃檗炒叁分

如有熱或腿脚無力加如有躁煩欲去衣者腎中伏火也更宜加之無此證勿用

厚朴叁錢貳分薑製

如腹脹者加之無則勿用

右爲細末湯浸飣餅和丸捻作餅子日乾搗如米粒大每服三錢白湯下

如氣不順。加橘皮。甚者加木香少許。量病人虛實。臨時斟酌與之。無令藥多妨其飲食。此治之大法也。

如止在陽明分爲瘰癧者。去柴胡、黍粘子二味。餘皆用之。

如在少陽分爲馬刀挾瘿者。去獨活、漏蘆、升麻、葛根。更加瞿麥穗三分。

如本人素氣弱。其病勢來時。氣盛而不短促者。不可考其平素。宜作氣盛而從病變之權也。宜加黃芩、黃連、黃蘗、知母、防己之類。視邪氣在上中下三處。

假令在上焦。加黃芩一半酒洗用。在中焦。加黃連一半酒洗用。在下焦。則加酒製黃蘗、知母、防己之類。選而用之。

如本人大便不通。而滋其邪盛者。加酒製大黃以利。

如血燥而大便燥乾者。加桃仁、酒製大黃二味。

如風結燥不行者。加麻仁、大黃。

如風澁而大便不行。加煨皂角仁、大黃、秦艽以利之。

如脈澁覺身有氣澁而大便不通者。加郁李仁、大黃以除氣燥也。

如陰寒之病。爲寒結閉而大便不通。以局方中半硫丸或加煎附子、乾薑冰冷與之。大抵用藥之法。不惟瘡瘍一說。諸疾病量人素氣弱者。當去苦寒之藥。多加人參、黃芪、甘草之類。瀉火而先補其元氣。餘皆倣此。

柴胡連翹湯

治男子婦人馬刀瘡。

中桂叁分。　當歸梢壹錢伍分。

炙甘草　酒黃蘗

柴胡　黃芩炒。

連翹已上各伍錢。　瞿麥穗陸錢。

右剉如麻豆大。每服五錢。水二大盞。煎至一盞。去柤稍熱。食後服之。

黍粘子湯

治耳痛生瘡。

昆布　蘇木　黍粘子貳錢。

蒲黃　草龍膽已上各壹分。　生地黃已上各叁錢。

連翹　生地黃　酒知母

黃芩　炙甘草　生甘草

柴胡　黃芪已上各叁分。　黍粘子

桃仁叁箇。　紅花少許。　當歸梢

黃連已上各貳分。

桔梗叁錢。

右剉如麻豆大。都作一服。水二盞。煎至一盞。去柤稍熱。食後服。忌寒藥。利大便。

淨液湯一名連翹防風湯。

治皮膚痒。胍下痒。背上痒。耳聾耳鳴。

桂枝貳分。　連翹　生地黃
桔梗　升麻　甘草已上各伍分。
當歸梢柒分。　麻黃　草豆蔻仁
羌活　防風　柴胡
蒼朮已上各壹錢。　酒黃芩壹錢。　紅花少許。

右剉如麻豆大。都作一服。水二盞。煎至一盞。去柤。食後熱服。

消腫湯

治馬刀瘡。

黍粘子炒。　黃連已上各伍分。
甘草已上各壹錢。　瓜蔞根　當歸梢
生黃芩　柴胡已上各貳錢。　黃芪已上各壹錢伍分。
紅花少許。　連翹叁錢。

右咬咀。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去柤稍熱。食後服。忌酒濕麵。

內托羌活湯

治足太陽經中左右尺脈俱緊。按之無力。尻臀生癰堅硬。腫痛大作。

肉桂叁分　連翹　炙甘草
蒼朮　橘皮已上各伍分　當歸梢
防風　藁本已上各壹錢　黃芪壹錢伍分
黃蘗酒製　羌活已上各貳錢

右咬咀。都作一服。水二盞。酒一盞。煎至一盞。去柤稍熱。空心服。以夾衣蓋癰上。使藥力行。罷去蓋之衣。

升麻托裏湯

治婦人兩乳間出黑頭瘡。瘡頂陷下作黑眼子。其脈弦洪。按之細小。

黃蘗貳分　肉桂叁分　黍粘子伍分
炙甘草　當歸身已上各壹錢
升麻　葛根已上各壹錢伍分
連翹

右咬咀。都作一服。水一大盞。酒半盞。同煎至一盞。去柤稍熱。食後服。

內托黃芪湯

賈德茂小男於左大腿近膝股內出附骨癰。不辯肉色。漫腫。皮澤木硬。瘡勢甚大。其左脚乃肝之髀上也。更在足厥陰肝經之分。少侵足太陰脾經之分。其脈左三部細而弦。按之洪緩。微有力。此藥主之。

生地黃壹分。　黃蘗貳分。　肉桂叁分。
羌活伍分。　當歸梢柒分半。　土瓜根酒製。
柴胡梢已上各壹錢。　連翹壹錢叁分。　黃芪貳錢。

右㕮咀。都作一服。酒一盞。水二盞。煎至一盞。去粗。空心熱服。

柴胡通經湯

治小兒項側有瘡。堅而不潰。名曰馬刀瘡。

柴胡　連翹　當歸梢
生甘草　黃芩　黍粘子
京三稜　桔梗已上各貳分。　黃連伍分。
紅花少許。

右剉如麻豆大。都作一服。水二大盞。煎至一盞。去粗。稍熱。食後服。忌苦藥泄大便。

白芷升麻湯

尹老家素貧寒。形志皆苦。於手陽明大腸經分出癰。幼小有癩疝。其臂外皆腫痛。在陽明左右寸脈皆

短中得之俱弦。按之洪緩有力。此癰得自八風之變。以脈斷之。邪氣在表。其證大小便如故。飲食如常。腹中和。口知味。知不在裏也。不惡風寒。止熱燥。脈不浮。知不在表也。表裏既和。邪氣在經脈之中。內經云。凝於經絡爲瘡癰。其癰出身半已上。故風從上受之。故知是八風之變爲瘡者也。故治其寒邪。調其經脈中血氣。使無凝滯而已。

炙甘草壹分。　升麻　桔梗已上各伍分。
白芷柒分。　當歸梢　生地黃已上各壹錢。
生黃芩壹錢伍分。　酒黃芩　連翹
黃芪已上貳錢。各　中桂少許。　紅花少許。

右咬咀。分作二服。酒水各一大盞半。同煎至一盞。去柤稍熱。臨臥服。一服而愈。

保生救苦散

治火燒或熱油烙及脫肌肉者。

生寒水石　大黃火煨。　黃蘗油炒。已上各等分。

右爲細末。用油調塗之。或乾用此藥塗之。其痛立止。日近完復。永無破傷風之患。

一上散

治諸般疥癬必效。

雄黃通明手呵破者。　黑狗脊　蛇床子炒。

熟硫黃已上各伍錢。　寒水石陸錢。　班貓拾箇去翅足毛研碎。

右另研雄黃、硫黃、寒水石如粉。次入班貓和蛇牀子、黑狗脊爲細末。同研勻。先洗疥癬。令湯透去痂。油調。手中擦熱。以鼻中臭三兩次擦上。可一上卽愈。

如痛甚及腫滿高起者。加寒水石一倍。

如不苦癢。只加黑狗脊。

如微癢。只加蛇牀子。

如瘡中有蟲。加雄黃。

如喜火炙湯浴者。加硫黃。

聖愈湯

治諸惡瘡血出多而心煩不安。不得睡眠。亡血故也。以此藥主之。

生地黃　熟地黃　川芎

人參已上各叁分。　當歸身　黃芪已上各伍分。

右咬咀如麻豆大。都作一服。水二大盞煎至一盞。去租稍熱。無時服。

獨聖散

治湯泡破火燒破瘡毒疼痛

生白礬

右爲細末芝麻油調掃瘡破處不拘時候

黃芪肉桂柴胡酒煎湯

治附骨癰堅硬漫腫不辨肉色行步作痛按之大痛

黃芪　當歸梢已上各貳錢　柴胡壹錢伍分

黍粘子炒　連翹　肉桂已上各壹錢

升麻柒分　炙甘草　黃蘗已上各伍分

右㕮咀好糯酒一大盞半水一大盞半同煎至一大盞去租空心温服少時便以早飯壓之不致大熱上攻中上二焦也

雜病門

安神丸

治心神煩亂怔忡兀兀欲吐胸中氣亂而熱有似懊憹之狀皆膈上血中伏火蒸蒸然不安宜用權衡法以鎮陰火之浮越以養上焦之元氣經云熱淫所勝治以甘寒以苦瀉之以黃連之苦寒去心煩除濕熱爲君以甘草生地黃之甘寒瀉火補氣滋生陰血爲臣以當歸補血不足以硃砂納浮留之火而

安神明也。

黃連壹錢伍分酒洗。　硃砂壹錢水飛。　炙甘草已上各伍分。　酒生地黃　酒當歸身

右件除硃砂水飛外。搗四味爲細末。同和勻。湯浸餘餅爲丸。如黍米大。每服十五丸。津唾嚥下。食後。

硃砂安神丸

治心煩懊憹。心亂怔忡。上熱。胸中氣亂。心下痞悶。食入反出。

硃砂肆錢。　黃連伍錢。　生甘草貳錢伍分。

右爲末。湯浸餘餅爲丸。如黍米大。每服十丸。食後津唾嚥下。

補氣湯

治皮膚間有麻木。乃肝氣不行故也。

白芍藥　橘皮不去白各壹兩伍錢。　炙甘草

黃芪已上各壹兩。　澤瀉伍錢。

右㕮咀。每服一兩。水二盞。煎至一盞。去柤溫服。

當歸補血湯

治婦人肌熱躁熱。目赤面紅。煩渴引飲。晝夜不息。其脈洪大而虛。重按全無。內經曰。脈虛血虛。脈實血

實又云血虛發熱證象白虎惟脈不長實爲辯也若悞服白虎湯必死此病得之於肌困勞役

黃芪壹兩　當歸身貳錢酒製

右㕮咀都作一服水二盞煎至一盞去柤稍熱空心服

柴胡升麻湯

治男子婦人四肢發熱肌熱筋骨熱表熱如火燎以手捫之烙人手夫四肢者屬脾土也熱伏地中此病多因血虛而得之又有胃虛過食冷物鬱遏陽氣於脾土之中此藥主之

升麻　葛根　獨活

羌活　白芍藥　人參已上各伍錢

炙甘草　柴胡已上各三錢　防風貳錢伍分

生甘草貳錢

右㕮咀每服五錢水二大盞煎至一盞去柤熱服忌寒冷之物

火鬱湯

治五心煩熱是火鬱於地中四肢者脾土也心火下陷於脾土之中鬱而不得伸故經云火鬱則發之

升麻　葛根　柴胡

白芍藥已上各壹兩　防風　甘草已上各伍錢

右咬咀。每服五錢。水二大盞。入連鬚葱白三寸。煎至一盞。去粗稍熱。不拘時候服。

小黃丸

化痰涎。和胃氣。除濕。治胸中不利。

黃芩壹兩。　半夏湯洗製。壹　白朮已上各伍錢。

陳皮　青皮去白。　黃芪已上各叁錢。

澤瀉貳錢。　乾薑壹錢伍分。

右爲末。湯浸餛餅爲丸。如菉豆大。每服五十丸。食遠。溫水下。

黃芩利膈丸

除胸中熱。利膈上痰。

生黃芩　炒黃芩已上各壹兩。　半夏

黃連　澤瀉已上各伍錢。　南星

枳殼　陳皮已上各叁錢。　白朮貳錢。

白礬伍分。

右爲末。湯浸餛餅爲丸。如梧桐子大。每服三五十丸。食遠。溫水下。忌酒濕麵。

補益腎肝丸

治目中流火。視物昏花。耳聾耳鳴。困倦乏力。寢汗惡風。行步不正。兩足欹側。臥而多驚。脚膝無力。腰以下消瘦。

柴胡　羌活　生地黃

苦參炒。　防己炒。已上各伍分。　附子

肉桂已上各壹錢。　當歸身叁錢。

右爲細末。熟水爲丸。如雞頭仁大。每服五十丸。食前溫水下。

大陽經壺藥

防風貳分。　羌活叁分。　紅豆貳箇。

右爲細末。鼻內嗑之。

麻黃茱萸湯

治胸中痛。頭痛。食減少。咽嗌不利。右寸脈弦急。

麻黃　羌活已上各伍分。　吳茱萸

黃芪　升麻已上各叁分。　黃芩

當歸　黃檗　葉本已上各貳分。

川芎　蔓荊子　柴胡

蒼朮　黃連　半夏已上各壹分

細辛少許　紅花少許

右剉如麻豆大。都作一服。水二盞。煎至一盞。去柤。稍熱服。食後。

黃芪湯

治表虛惡風寒。

黃芪伍錢　甘草叁錢　香白芷貳錢伍分

葉本　升麻已上各貳錢　草豆蔻

橘皮已上各壹錢伍分　麻黃　當歸身已上各壹錢

蓮花青皮柒分　柴胡陸分　黃蘗少許

右咬咀。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去柤。不拘時服。

除濕補氣湯一名清神補氣湯。

治兩腿麻木。沉重無力。多汗喜笑。口中涎下。身重如山。語聲不出。若寸脈洪大。

升麻陸錢　蒼朮肆錢　酒黃蘗

柴胡　黃芪叁已上各錢　酒知母

葉本　生甘草　當歸已上各貳錢

五味子　陳皮已上各壹錢伍分。

右剉如麻豆大。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去柤。空心服之。待少時以早飯下之。

參歸湯

補氣血俱不足。

黃芪柒分。　甘草　生地黃已上各伍分。

柴胡　草豆蔻仁　升麻已上各肆分。

當歸身叁分。　熟地黃　人參已上各貳分。

益智仁少許。　紅花少許。

右剉如麻豆大。都作一服。水二盞。煎至一盞。去柤。食遠服。

升陽湯

治陽蹻癎疾。足太陽經寒恐則氣下行。宜升陽氣。

炙甘草伍錢。　麻黃不去節。　防風已上各捌錢。

羌活壹兩伍錢。

右㕮咀。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去柤。稍熱。空心服之。

自汗門

自汗論

或問濕之與汗爲陰乎爲陽乎曰西南坤土也在人則爲脾胃也人之汗猶天地之雨也陰滋其濕則爲霧露爲雨也陰濕下行地之氣也汗多則亡陽陽去則陰勝也甚爲寒中濕勝則音聲如從甕中出濕若中水也相法家有說土音如居深瓮裏言其壅也遠也不出也以明其濕審矣又知此二者亦爲陰寒也內經云氣虛則外寒雖見熱中蒸蒸爲汗終傳大寒知始爲熱中表虛亡陽不任外寒終傳寒中多成痺塞矣色以候天脈以候地形者乃候地之陰陽也故以脈氣候之皆有形無形之可見者也

調衞湯

治濕勝自汗補衞氣虛弱表虛不任風寒

黃芪　麻黃根已上各壹錢羌活柒分

生甘草　當歸梢　生黃芩

半夏壹製各伍分已上　麥門冬　生地黃叁分已上各

猪苓貳分　蘇木　紅花已上各壹分

五味子柒箇

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱服

中風證必自汗不得重發其汗

清燥湯

治六月七月間濕令大行子能令母實而熱旺濕熱相合必刑庚大腸寒冷以救之燥金受濕熱之邪絕寒水生化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰已下痿軟攤瘓不能動行步不正兩足欹側此藥主之

黃芪壹錢伍分　橘皮
澤瀉已上各伍分　人參
升麻已上各叁分　炙甘草
當歸身　生地黃
猪苓已上各貳分　柴胡
黃連　蒼朮已上各壹分

右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去粗空心熱服

當歸六黃湯

治盜汗之聖藥也

當歸　生地黃
黃檗　黃芩
白朮
白茯苓
麥門冬
神麴末
酒黃檗
五味子玖個
熟地黃
黃連已上各等分

黃芪加一倍

右爲麤末每服五錢水二盞煎至一盞食前服小兒減半服之

紅豆散

治頭重如山此濕氣在頭也

麻黃根炒伍錢　苦丁香伍分　羌活炒

連翹炒已上各叁分　紅豆拾個

右爲細末鼻內嗑之

治血通經湯

靈壽縣董監軍癸卯冬大雪時因事到眞定忽覺有風氣暴至診候得六脈俱弦甚按之洪實有力其證手攣急大便祕澀面赤熱此風寒始至加於身也四肢者脾也以風寒之邪傷之則搐急而攣痺乃風淫末疾而寒在外也內經曰寒則筋攣正謂此也本人素飲酒內有實熱乘於腸胃之間故大便祕澀而面赤熱內則手足陽明受邪外則足太陰脾經受風寒之邪用桂枝甘草以却其寒邪而緩其急搐又以黃蘗之苦寒滑以瀉實而潤燥急救腎水用升麻葛根以升陽氣行手足陽明之經不令遏絕更以桂枝辛熱入手陽明之經爲引用潤燥復以芍藥甘草專補脾氣使不受風寒之邪而退木邪專益肺金也加人參以補元氣爲之輔佐加當歸身去裏急而和血潤燥此藥主之

芍藥伍分　　升麻　　葛根
人參　　當歸身　　炙甘草已上各壹錢。
酒黃蘗　　桂枝已上各貳錢。

右剉如麻豆大。都作一服。水二大盞。煎至一盞。熱服。不拘時。令暖房中近火。摩搓其手。

瀉榮湯

治癘風滿面連頭。極癢不任。眉毛脫落。先砭其處。令惡氣消盡。後服此藥。

連翹　　升麻已上陸分。　　桔梗伍分。
生黃芩　　生地黃已上肆分。　　黃芪
蘇木　　黃連　　地龍
全蠍　　當歸已上叁分。　　白豆蔻
人參已上各貳分。　　甘草壹分半。　　梧桐淚壹分。
麝香少許。　　桃仁叁個。　　蚦蟲去翅足炒。叁箇。
水蛭叁個。令烟盡炒。

右剉如麻豆大。除連翹、梧桐淚、白豆蔻另爲細末。麝香、蚦蟲、水蛭三味同爲細末。都作一服。水二盞。酒一盞。入連翹煎至一盞。去柤。再入白豆蔻二味并麝香等再煎至七分。稍熱。早飯後午前服之。忌酒濕

麵生冷硬物。

人參益氣湯

治兩手指麻木。四肢困倦。怠惰嗜臥。乃熱傷元氣也。

黃芪捌錢。　生甘草　人參伍錢已上各。
白芍藥叁錢。　柴胡貳錢伍分。　炙甘草
升麻貳錢已上各　五味子壹百肆拾個。

右㕮咀。分作四服。每服水二盞。煎至一盞。去柤稍熱。食遠服。

導氣湯

治兩腿麻木沉重。

黃芪捌錢。　甘草陸錢。　青皮肆錢。
升麻　柴胡　當歸梢
澤瀉貳錢已上各　橘皮壹錢。　紅花
五味子壹百貳拾個。

右㕮咀。分作四服。每服水二大盞。煎至一盞。去柤。食前熱服。

補中湯

治面黃汗多目赤四肢沉重減食腹中時時痛欬嗽兩手寸脈短右手脈弦細兼澀關脈虛

升麻　柴胡　當歸已上各貳分
神麴炒壹分　澤瀉肆分　大麥蘗麵
蒼朮已上各伍分　黃芪貳錢伍分　炙甘草捌分
紅花少許　五味子個貳拾

右㕮咀分作二服水二盞煎至一盞去柤食遠服

麻黃蒼朮湯

治秋冬每夜五更嗽連聲不絕乃至天曉日高方緩口苦兩脅下痛心下痞悶臥而多驚筋攣肢節疼痛痰唾涎沫日晚神昏呵欠不進飲食

麻黃捌錢　蒼朮伍錢　黃芪壹錢伍分
草豆蔻陸分　柴胡　羌活已上各伍分
生甘草　當歸梢　防風已上各肆分
炙甘草　黃芩已上各叁分　五味子玖個

右㕮咀分作二服水二盞煎至一盞稍熱臨臥服

上清湯

清利頭目。寬快胸膈。

人參　蔓荊子已上各伍分。防風壹錢。
葛根壹錢伍分。黃芪叁錢。甘草肆錢。

右咬咀。分作二服。水二盞。煎至一盞。去粗。臨臥熱服。以夾衣蓋覆不語。須臾汗出爲效。

羌桂湯一名麻黃蒼朮湯。

治寒濕所客。身體沉重。胃脘痛。面色痿黃。

蒼朮貳錢。麻黃　炒神麴
橘皮　白茯苓　澤瀉已上各壹錢。
桂枝　半夏　草豆蔻仁
猪苓已上各伍分。黃芪叁分。　炙甘草貳分。
杏仁拾個。

右都作一服。水二盞。生薑五片。煎至一盞。去粗。食前熱服。

正氣湯

治盜汗。

炒黃檗　炒知母已上各錢伍分。　炙甘草伍分。

右爲麤末作一服。水二盞。煎至一盞。食前温服。

迹痛丸

治打撲閃損。腰痛不可忍。

乳香　沒藥各壹錢。

烏梅壹個。　白粟米炒黃壹錢。

右爲細末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。細嚼。温酒空心下。

退熱湯

治表中虛熱。或遇夜則甚。

黃芪壹錢。　柴胡柒分。

黃連酒製。　黃芩

地骨皮　生地黃去血熱

當歸身　升麻已上各叁分。

右㕮咀。作一服。水二盞。煎至一盞。去粗。食遠温服。

如身體力困者。加麥門冬、五味子。已上各伍分。人參、甘草。已上各壹錢。

解表升麻湯　白葛苣子壹兩。炒黃。

生甘草

芍藥

蒼朮已上各伍分。

治遍身壯熱骨節疼痛。

升麻　羌活　蒼朮已上各壹錢。
防風捌分。　柴胡　甘草已上各柒分。
當歸　羣本已上各伍分。　橘皮叁分。
冬加麻黃。不去節。　春加麻黃。去節。

右㕮咀作一服。水二盞。煎至一盞。去粗。温服。後以葱醋湯發之。得微汗爲效。

天麻黃芪湯

治表有風證。因連日酣飲。其證復來。右口角幷眼頗有側視。及左手左脚腿麻木疼痛。

天麻　芍藥　神麴炒。
羌活肢節痛去之。不已上各貳分。　茯苓已上各叁分。　人參
黃連已上各肆分。　當歸伍分。　黃芪
甘草　升麻　葛根
黃蘗　蒼朮已上各陸分。　澤瀉柒分。
柴胡玖分。

右㕮咀作一服。水三盞。煎至一盞。去粗。食遠温服。或加猪苓。陸分。

健步丸

治膝中無力。伸而不得屈。屈而不能伸。腰背腿膝沉重。行步艱難。

防己（酒洗）壹兩。　羌活　柴胡

滑石炒。　炙甘草　瓜蔞根（酒洗）已上伍錢。

澤瀉　防風已上叁錢。　苦參酒洗。

川烏已上各壹錢。　肉桂伍分。

右爲細末。酒糊爲丸。如梧桐子大。每服七十丸。煎愈風湯下。空心服。

白朮除濕湯

治午後發熱。背惡風。四肢沉重。小便或多或少。黃色。此藥又治汗後發熱。

白朮壹兩。　生地黃炒。　地骨皮

澤瀉　知母已上各柒錢。　赤茯苓

人參　炙甘草　柴胡已上各伍錢。

右爲麤末。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去柤。食遠温服。

如小便快利。減茯苓澤瀉一半。

如有刺痛。一料藥中加當歸身（酒洗）柒錢。

加味四君子湯

治久瘧熱多寒少不止.

白朮　白茯苓　人參

甘草　柴胡　薄荷葉

黃芩已上各等分.

右咬咀.每服五錢.水二盞.生薑三片.棗一枚.煎至一盞.去粗.不拘時候服.

瀉血湯

治發熱晝少而夜多.太陽經中尤甚.晝病則在氣.夜病則在血.是足太陽膀胱血中浮熱.微有氣也.既病人大小便如常.知邪氣不在臟腑.是無裏證也.外無惡寒.知邪氣不在表也.有時而發.有時而止.知邪氣不在表不在裏.知在經絡也.夜發多而晝發少.是邪氣下陷之深也.此雜證當從熱入血室而論之.

生地黃酒洗.炒.　熟地黃

丹參酒炒.　當歸酒洗.去土.　蒲黃

柴胡去芦.　甘草梢炙.　漢防己酒洗.炒.

桃仁去皮.尖.雙仁.湯浸.　羌活已上各壹兩.

右爲麤末每服五錢水一盞半煎至一盞去粗空心温服

洗面藥

治面有黯黯或生瘡或生痤痱及粉刺之類幷去皮膚燥癢去垢膩潤澤肌膚

皂角叁斤去皮弦子另搗　好升麻捌兩　楮實子伍兩
白芨壹兩細剉　甘松染錢　縮砂連皮
白丁香臘月收　三柰子已上各伍分　蔾豆捌合揀淨另搗
糯米壹升貳合

右爲細末用之如常

瑩肌如玉散

白丁香　白芨　當歸梢
白歛已上各壹兩　白芷染錢　升麻已上各伍錢　白茯苓
白蒺藜　麻黃去節貳錢　白附子
楮實子已上各叁錢　小椒壹錢
連翹已上各伍分壹

右爲細末用之如常

面油摩風膏

麻黃　升麻去黑皮。　防風已上各貳錢。

羌活去皮。　當歸身　白芨

白檀已上各壹錢。

右用小油半斤。以銀器中熬。綿包定前藥於油中熬之。得所澄淨。去粗。入黃蠟一兩再熬之爲度。

小兒門

治驚論

外物驚。宜鎮心。以黃連安神丸。若氣動所驚。宜寒水石安神丸。大忌防風丸。治風辛温之藥。必殺人。何也。辛散浮温熱者火也。能令母實。助風之氣盛。皆殺人也。因驚而泄青色。先鎮肝。以硃砂之類。勿用寒涼之氣。大禁涼驚丸。風木旺必克脾胃。當先實其土。後瀉其木。閻孝忠編集錢氏方。以益黃補上。慢矣。其藥有丁香辛熱。助火。火旺土愈虛矣。青橘皮瀉肺金。丁香辛熱。大瀉肺與大腸。脾實當瀉子令脾胃虛。反更瀉子而助火。重虛其土。殺人無疑矣。其風木旺證。右關脈洪大。掌中熱。腹皮熱。豈可以助火瀉金。如寒水來乘脾土。其病嘔吐。腹痛。瀉痢青白。益黃散聖藥也。今立一方。先瀉火補金。大補其土。是爲神治之法。

黃芪湯

黃芪貳錢。　人參壹錢。　炙甘草伍分。

右㕮咀作一服。水一大盞。煎至半盞。去柤。食遠服。加白芍藥尤妙。

此三味皆甘温。能補元氣。甘能瀉火。內經云。熱淫于內。以甘瀉之。以酸收之。白芍藥酸寒。寒能瀉火。酸味能瀉肝而大補肺金。所補得金土之位大旺。火虛風木何由而來尅土。然後瀉風之邪。

夫益黃散理中丸養神丸之類。皆治脾胃寒濕大盛。神品之藥也。若得脾胃中伏熱火勞役不足之證。及服熱藥巴豆之類。胃虛而成慢驚之證。用之必傷人命。夫慢驚風者。皆由久瀉脾胃虛而生也。錢氏以羌活膏療慢驚風。誤矣。脾虛者。由火邪乘其土位。故曰從後來者爲虛邪。火旺能實其木。木旺故來尅土。當於心經中以甘温補土之源。更於脾土中瀉火。以甘寒更於脾土中補金。以酸涼致脾土中金旺火衰。風木自虛矣。損食多進藥愈。前藥是也。

益黃散

治胃中風熱。

黃芪貳錢。　陳皮去白。人參已上各壹錢。

芍藥柒分。　生甘草　熟甘草已上各伍分。

黃連少許。

右爲細末。每服二錢。水一盞。煎至五分。食前服。

升陽益血湯

二月間有一小兒未滿一百日病腹脹二日大便一度瘦弱身黃色宜升陽氣滋血益血補血利大便

蠍梢貳分　神麴末　升麻叁分　已上各

當歸　厚朴壹錢　已上　桃仁拾個

右都作一服水一大盞煎至半盞去粗食遠熱服

厚腸丸

治小兒失乳以食飼之未有食腸不能尅化或生腹脹四肢瘦弱或痢色無常

厚朴　青皮貳分　已上各　橘紅

半夏　蒼朮　人參叁分　已上各

枳實　麥蘗麵　神麴末伍分　已上各

右爲極細末水煮麵糊爲丸如麻子大每服二十丸温水送下食前忌飽食

補陽湯

時初冬一小兒二歲大寒證明堂青脈額上青黑腦後青絡高起舌上白滑喉鳴而喘大便微青耳尖冷目中常常淚下仍多眵胸中不利臥而多驚無搐則寒

黃蘗　橘皮　葛根

連翹　蠍梢　炙甘草壹分　已上各

升麻　黃芪　柴胡已上各貳分
當歸身　麻黃已上各叁分　吳茱萸
生地黃　地龍已上各伍分

右咬咀。都作一服。水一大盞半。煎至六分。去柤。乳食後熱服。服藥之後。添喜笑。精神出。氣和順。乳食旺。

大蕪荑湯一名梔子茯苓湯。

治黃疳土色爲熱爲濕。當小便不利。今反利。知黃色爲燥胃經中大熱。髮黃脫落。知膀胱與腎俱受土邪。乃大濕熱之證。鼻下斷作瘡者。上逆行榮氣伏火也。能乳者。胃中有熱也。寒則食不入。喜食土者。胃不足也。面黑色者。爲寒爲痺。大便青寒褐色。血黑色。熱畜血中。間黃色。腸中有熱。治法當滋榮潤燥。除寒熱。致津液。

防風　黃連壹已上各分　黃蘗
炙甘草　麻黃不去根節貳分　羌活已上各貳分
山梔子仁　柴胡　茯苓叁已上各分
當歸肆分　大蕪荑　白朮伍已上各分

右剉如麻豆大。都作一服。用水一大盞半。煎至六分。去柤。食前稍熱服。

場氣泄黃湯一名茯苓滲濕湯。

治小兒面色痿黃腹膜脹食不能下

白朮　柴胡已上各半分　升麻壹分

桂枝　麻黃　羌活　蒼朮　吳茱萸

厚朴　神麴末　白茯苓　猪苓　草豆蔻

橘紅已上各貳分　杏仁貳個　青皮　澤瀉　黃檗

右都作一服水二大盞煎至一盞去粗食前温服

中滿分消丸

枳實　黃連去鬚　厚朴已上各伍分

生薑　薑黃　猪苓已上各壹錢

橘皮　甘草　白朮已上各壹錢伍分

砂仁　澤瀉　茯苓已上各叁錢

半夏肆錢　黃芩壹兩貳錢

右爲細末。湯浸餌餅爲丸。如黍米大。每服三五十丸。温水下。

消痞丸

黄連伍錢。　黄芩貳錢。　厚朴柒分。
薑黄伍分。　乾生薑　人參肆分。　已上各
甘草叁分。　枳實貳分。　橘皮壹分。

右爲細末。湯浸餌餅爲丸。如黍米大。每服三十丸。隨乳下。

痴疹論

夫痴疹始出之證。必先見面燥腮赤。目胞亦赤。呵欠煩悶。乍涼乍熱。欬嗽噦噴。足稍冷。多睡驚。並瘡疹之證。或生膿胞。或生小紅痴。或生癍疹。此三等不同。何故俱顯上證而後乃出。蓋以上諸證。皆太陽寒水起於右腎之下。煎熬左腎。足太陽膀胱寒水夾脊。逆流上頭下額。逆手太陽丙火不得傳導。逆於面上。故顯是證。蓋壬癸寒水尅丙丁熱火故也。諸痴證皆從寒水逆流而作也。醫者當知此理。乃敢用藥。夫胞者一名赤宮。一名丹田。一名命門。主男子藏精施化。婦人繫胞有孕。俱爲生化之源。非五行也。非水亦非火。此天地之異名也。象坤土之生萬物也。夫人之始生也。血海始淨。一日二日。精勝其血。則爲男子。三日四日五日。血脈已旺。精不勝血。則爲女子。二物相搏。長生先身。謂之神。又謂之精。道釋二門言之。本來面目是也。其子在腹中十月之間。隨母呼吸。呼吸者。陽氣也。而生動作。滋益精氣神。饑則食母血。渴則飲母血。兒

隨日長。皮肉筋骨血脈形氣俱足。十月降生。口中尚有惡血。啼聲一發。隨吸而下。此惡血復歸命門胞中。僻於一隅。伏而不發。直至因內傷乳食。濕熱之氣下流。合於腎中。二火交攻。致營氣不從。逆於肉理。惡血乃發。諸瘡疹皆出於膀胱壬水。其瘍後聚肉理。歸於陽明。故三番瘡始顯之證。皆足太陽壬膀胱尅丙小腸。其始出皆見於面。終歸於陽明肉理。熱化爲膿者也。二火熾甚。反勝寒水。遍身俱出。此皆出從足太陽傳變中來也。當外發寒邪。使令消散。內瀉二火。不令交攻其中。令濕氣上歸。復其本位。可一二服立已。仍令小兒以後再無二番瘡出之患。此內經之法。覽者詳之。

消毒救苦散

治瘡證悉具。消化便令不出。如已出希者再不生瘡。

防風　羌活　麻黃根
升麻　生地黃　連翹（初出者減。出大者加。）
酒黃蘗（已上各伍分。）　當歸身　黃連（已上各叁分。）
川芎　蠶本　柴胡
葛根　酒黃芩　生黃芩
蒼朮（已上各貳分。）　細辛　生甘草
白朮　陳皮　蘇木

紅花已上各壹分。　吳茱萸半分。

右剉如麻豆大。每服五錢。水二大盞。煎至一盞。去粗。稍熱。空心服。

夫斑疹出者。皆因內傷。必出斑。營氣逆故也。大禁牽牛巴豆食藥。宜以半夏、枳朮、大黃、益智仁之類。去其泄瀉。止其吐。若耳尖冷。呵欠。睡中驚。噦噴。眼澀。知必出斑也。諸大膿泡。小水泡。斑疹。瘾三色。皆營氣逆而寒。復其表。宜以四味升麻湯中加當歸。身連翹。此定法也。

如肺成膿。斑先嗽喘。或氣高而喘促。加人參。少加黃芩。以瀉伏火而補元氣。

如心出小紅斑。必先見嗌乾。驚悸。身熱。肌肉腫。脈弦洪。少加黃連。

如命門出瘾疹。必先骨疼身熱。其疼痛不敢動搖。少加生地黃。又加黃蘗。諸斑疹皆爲陰證。瘡須皆因內傷飲食。脾胃不足。營氣逆行。雖大熱內熾。陰覆其外。治法如前。

辯小兒斑證。

呵欠　噦噴　睡中發驚

或耳尖冷　眼澀

或辯復食。

口熱　或口醋氣　妳辦不消

或腹中痛

如瘡證少具。其瘡未發。乃與升麻湯三五錢。帶熱服之。待身表温和。瘡疹已顯。服藥乃止。

如其身涼。其瘡未出。辯得是瘡證。無問服數。直候身表温和。及瘡瘡已顯。然後乃止。只時時與桔梗湯。寬胸膈。利咽喉。

桔梗湯

如瘡已出。只時時與之。快咽喉。寬利胸膈。

桔梗貳錢。　甘草壹錢。

右爲麤末。每服三錢。水一大盞。煎至六分。去柤。大温。時時服之。不可計服數。

如見傷食證。又見瘡證。先與不犯大黃巴豆藥。尅化過。再與升麻湯。

如食重傷。前藥不能過。再與犯大黃巴豆藥過。

如大便行。當卽便與升麻湯服之。恐瘡子內陷。已後臨時作罪過。

如瘡子已出稠密。身表熱。急與下項。

黍粘子湯

如瘡子已出稠密。身表熱。急與此藥服之。防後青乾黑陷。

黍粘子炒香。　當歸身酒洗。　炙甘草已上各壹錢。

柴胡　連翹　黃芪

黃芩已上各壹錢伍分　地骨皮已上各貳錢

右同爲麤末每服二錢水一大盞煎至六分去柤温服腹空服藥畢日休與乳食

麻黃柴胡升麻湯

治小兒寒鬱而喘喉鳴腹中鳴腹滿鼻流清涕脈沉急而數

麻黃　草豆蔻仁　益智仁已上各錢伍分

吳茱萸　厚朴已上各貳分　薑歸梢

甘草　柴胡　生黃芩已上各壹分

升麻　神麴　蘇木半已上各分

全蠍貳箇　紅花少許

右剉如麻豆大分作二服水一大盞煎至七分食遠服忌風寒微有汗則效

王雲五主編

叢書集成初編

蘭室秘藏

中華民國二十八年十二月初版

撰者 李杲

發行人 王雲五 長沙南正路

印刷所 商務印書館

發行所 商務印書館 各埠

（本書校對者潘同曾）

G一六二〇上

宓